

合成抗菌製劑

# 維 妥 膠 囊

## Victol Capsules

衛署藥製字第000422號

Nalidixic acid是Naphthyridin一種衍生物，對於革蘭氏陰性菌、桿菌具有強力之抗菌及抗感染力，由於使用抗生素、磺胺劑、對此菌可產生不感性菌，而本劑對此菌則不產生此缺點，所以對於革蘭氏陰性菌等所引起之尿路感染症、細菌性腸疾患，具有優異之治療效果。

【成 分】每膠囊含：

Nalidixic acid.....500mg  
Corn Starch, Calcium Stearate

【特 徵】

- 1.是一合成抗菌劑。
- 2.對於大腸菌及各種革蘭氏陰性菌有優良的抗菌及抗感染力。
- 3.經由口服，可迅速的由消化道吸收，而很快達到血中、尿中、膽汁中最高有效濃度。
- 4.本劑不會產生交叉耐性現象。
- 5.本劑幾乎不產生副作用，然大量投與時，偶而可能引起嘔氣、嘔吐，但減量或停用即行消失。

【適 應 症】

急慢性尿路感染症(腎盂炎、尿道炎、膀胱炎)、膽道感染症(膽囊炎、膽管炎)、細菌性痢疾、疫痢、急慢性腸炎。

【用法用量】

通常成人一日4~6粒，分三~四次服用之，小孩依年齡、體重應用之，原則上，小孩用量為一日量50mg/kg。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.服用本劑有時微呈現腸胃障礙、昏睡、發生皮膚反應等現象，但停藥後馬上消失。
- 2.一個月以下嬰兒及懷孕三個月以內之孕婦不得使用本劑。
- 3.繼續使用本劑一至二星期以上應作定期血液及肝臟機能試驗。
- 4.糖尿病患者於服用本劑期間檢驗尿糖時應採用試紙法如CLINISTIX TESTTAP等而不宜使用BENEDICT FEHLING或CLINIC TEST等法以避免錯誤，概因本品在體內即部份變成糖羧基結合物(GLUCURONIC CONJUGATE)排出體外，此時如使用還原法檢驗尿糖則易生錯誤。

【包 裝】100粒、200粒、500粒瓶裝，1000粒罐裝。



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>