

# 必利那痛錠300毫克

## PYLINATON Tablets 300mg

【作用】：本品為一種解熱鎮痛劑。  
 △本品對於頭痛、關節痛、肌肉痛，有緩解作用。  
 △本品不含阿斯匹靈，不刺激胃。

【成分】：

有效成分及含量：每錠含(Each Tablet contains):

Acetaminophen.....300mg

其他成分(賦形劑)：Stearic acid、Povidone、Sodium Starch Glycolate、Aerosil、Avicel、Isopropanol.

【用途(適應症)】：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一)3歲以下。
  - (二)成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。
  - (三)有肝臟疾病的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- 四、其他使用上注意事項：
  - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二)避免陽光直射。
  - (三)勿超過建議劑使用量。
  - (四)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
  - (五)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。

【用法用量】：

成人及12歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，每24小時內不可超過5次，每次1錠。
6歲以上未滿12歲	每次1/2錠。
3歲以上未滿6歲	每次1/4錠。
3歲以下	請洽醫師診治。

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
- (三)服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀:胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (四)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：2-1000錠塑膠瓶裝。  
 【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。  
 【儲存】：請置於25℃以下，並避光存放。



天下生物科技股份有限公司 委託  
 井田國際醫藥廠股份有限公司 製造  
 台灣台中市大甲區幼獅路32號  
 冠丞生技股份有限公司 代理  
 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路二段297號  
 訂購專線：(03) 8537922