



“永信”

紅黴素

Erythromycin

Capsules "Yung Shin"

EMC-006
衛署藥製字第03775號
Code No.:32009

3.98cm

膠囊



在日常生活中呼吸道的疾患是最普遍的了，常因感冒或空氣傳染而引起喉頭炎，支氣管炎，扁桃腺炎，甚至肺炎。在這些症狀的早期治療期間，若藥物使用不當，常難以收到迅速抑制發作的效果。在臨床使用經驗裡，凡有抗藥性病例或使用一般抗生素、消炎片無效者，紅黴素常有良好的表現。本藥為白色結晶粉末，無臭味或苦味，甚易服用。在室溫下很安定，有效期間在兩年以上。其適用範圍不只呼吸系統，對其他細菌所引起之感染，尤以葡萄球菌、溶血性鏈球菌及肺炎球菌所引起者更佳。本藥之月桂酸鹽之紅黴素不受胃酸影響，故口服後吸收量一致可靠，且吸收迅速，於半小時內達到有療效之血中濃度，1至2小時內達到最高濃度，復因本藥經膽道排泄緩慢，故可在體內保持高且持久之濃度。

【成 分】每膠囊中含：

Erythromycin Estolate.....250 mg(Potency)

【賦 形 劑】

Corn Starch Dried、Talc、Magnesium Stearate、Capsule #0 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF、Allura Red AC、Iron Oxide Yellow)。

【適 應 症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、淋菌、軟性下疳、梅毒及一般紅絲菌感受性菌引起之感染症。

【用法・用量】

1. 通常成人量每次250mg，每六小時一次，病情較重者每次500mg，每六小時一次。

兒童通常量為每日每磅體重20mg，分四次服用。重症可增至倍量。

2. 本藥須由醫師處方使用。

【注 意 事 項】

1. 肝功能障礙，伴或不伴有黃疸，主要發生於成人，服用Erythromycin Estolate，可能伴隨有不適、噁心、嘔吐、腹部絞痛和發熱，對於急性腹部手術之患者，可能同時有嚴重的腹痛發生。如有上述現象出現，宜立即停藥。

2. 對本藥曾有過敏的先例和先前已有肝疾患之患者，禁服本藥。

3. 因本藥主要由肝臟排泄，對肝功能障礙者須小心服用此類抗生素。

4. 孕婦使用：其安全性未確立，宜衡量利弊再使用。

5. 藥物相互作用：使用本藥併用高劑量的theophylline可能增加theophylline的血漿濃度，同時增加theophylline的毒性，故併用時theophylline宜減量，本藥與Warfarin併用時將延長凝血時間。

6. 副作用：

最常發生的副作用包括：胃腸系（如腹部痙攣和不適）及依使用劑量多寡可能發生噁心、嘔吐、下痢。

輕微的過敏反應：蕁麻疹和其他皮膚紅。

嚴重的過敏反應：anaphylaxis過敏性。

尚有可逆性之聽力喪失，主要因為病人有腎衰竭和大量使用所致。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。

2. 於25°C以下儲存。

3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

100粒、1000粒，盒裝、瓶裝、罐裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140799