副腎皮質激素製劑

舒爽 錠

SUSWUN TABLETS

衛署藥製字第 03902 號

舒爽錠所含成分 Triamcinolone 為歐美發明之副腎皮質激素製劑，本品無向來之鈉貯留亢進，鉀排泄增加，以及伴隨之浮腫，高血壓肌無力狀態，心臟不全等副腎皮質激素常有之副作用，誠為藥理上優良之醫療聖品。

「成分」:每一錠中含

Triamcinolone 4mg

「作用」:

本品屬於 Glucocorticoid 效力為 Hydrocortisone 之 10~40 倍，Prednisolone 3~10 倍強，但完全無 mineral corticoid 之作用，因此具有抗炎症，抗過敏症作用，在臨床上作為 Glucocorticoid 使用場合時亦無其他同類藥品常有之 Na 及水貯留增加以及促進鋅之尿排泄而招致 K 缺乏等嚴重之別作用相反地具有促進 Na 及水之排泄與向來之 Glucocorticoid 比較還有以下之優點:

1.很少發生因鉀之欠乏而致之心不全。

2.不必限制食鹽攝取及 K 鹽補給。

3.常用量對血壓完全無影響，高血壓患者亦可服用。

4.誘發胃、十二指腸潰瘍、胃多孔症、糖尿病等症之程度很低。

5.很少會誘發精神障害、快樂感。

6.常用量很少引起鈣、燐、氨之質平衡，長期間投與雖略有氮損失發生，但充分補充蛋白質則即能保持氮素之平衡。

「適應症」:

風濕樣關節炎、膠原病、(急性播種狀紅斑性狼瘡、皮膚硬化症、結節性動脈周圍炎、皮膚肌炎。)過敏性疾患(支氣管氣喘、蕁麻疹)，結合織炎、關節炎樣疾患(滑液囊炎、腱炎、關節周圍炎)，重症皮膚疾患(濕疹、乾癬、皮膚炎、天疱瘡)。

「用法 • 用量」:

通常成人最初一日量為 8~16mg(2~4 粒)，分四次於飯後及就寢前服用待症狀減輕後，開始每日減 2mg 直至最小有效維持量。本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」:

1.急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品，以治療感染疾病。

2.對消化管障害如胃腸潰請特別注意。

3.因主要副作用引起浮腫，血壓上升尤以腎臟疾患及高血壓患者請注意。

4.糖尿病患者佳用時有增加 insulin 藥量的必要者請注意。

5.對於有神經病因素者多加注意。

6.服用本劑期間請充分補充蛋白質。

「貯存方式」:

室溫避光保存。

「包裝」:

100`s 盒裝。

100`s、200`s、500`s、1000`s 瓶裝。

信東生技股份有限公司居禮廠

台北縣淡水鎮忠山里中洲子 3 之 1 號