

“倍達”

# 咳 嗽 液

(薑口味)

## KASOU Solution “Beydar”

本劑含有之主要成份 Guaiacol Glyceryl Ether 為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑中所含桔梗流浸膏為桔梗科植物 *Platycodon Glaucus*，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志流浸膏，甘草流浸膏，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

### 【成 分】 Each ml contains :

Guaiacol Glyceryl Ether .....	5	mg
Platycodon Fluid Extract .....	0.2	mg
Polygala Fluid Extract .....	0.05	mg
Glycyrrhiza Fluid Extract .....	0.1	mg

### 【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alcohol, Ginger Oil, Lemon Flavor, Prune Flavour, Strawberry Flavor, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

### 【適應症】 祛痰。

【用法用量】 通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 2ml，2 歲以下服用 1ml，一日服用三次。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

### 【注意事項】

- 一、 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：  
(一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。  
(二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 四、 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 六、 高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 七、 一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、 服用本劑者應避免開車。

### 【警 語】

- 一、 吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、 祛痰劑宜空腹服用。

### 【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】 60 ~ 4000 公撮瓶裝。

衛署藥製字第 004018 號

製 造 廠：長安化學工業股份有限公司  
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委 託 者：倍達藥業股份有限公司  
新北市永和區中正路 368 巷 1 弄 20 號

“倍達”

# 咳嗽液

(人參口味)

## KASOU Solution “Beydar”

本劑含有之主要成份 Guaiacol Glyceryl Ether 為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑中所含桔梗流浸膏為桔梗科植物 *Platycodon Glaucus*，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志流浸膏，甘草流浸膏，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

**【成分】** Each ml contains :

Guaiacol Glyceryl Ether .....	5	mg
Platycodon Fluid Extract .....	0.2	mg
Polygala Fluid Extract .....	0.05	mg
Glycyrrhiza Fluid Extract .....	0.1	mg

**【賦形劑】**

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alcohol, Ginseng Flavor, Lemon Flavor, Prune Flavour, Strawberry Flavor, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

**【適應症】** 祛痰。

**【用法用量】** 通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 2ml，2 歲以下服用 1ml，一日服用三次。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【注意事項】**

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
  - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
  - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 六、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

**【警語】**

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

**【副作用】**

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

**【包裝規格】** 60 ~ 4000 公撮瓶裝。

衛署藥製字第 004018 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司  
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：倍達藥業股份有限公司  
新北市永和區中正路 368 巷 1 弄 20 號