鎮痛消炎劑

博痛膠囊

Poton Capsules

衛署藥製字第 04287 號

「主成分」:每膠囊含:

Mefenamic Acid 250mg

賦形劑

Starch Corn Dried

Calcium Stearate

Lactose

「膠囊殼成分」:

Each Empty Capsule Contain：

Cap：

Gelatin(明膠)

Sodium Lauryl Sulfate(硫酸月桂酯鈉)

Titanium Dioxide(二氧化鈦)

Brilliant Blue FCF (藍色一號)

Tartrazine (黃色四號)

Purified Water(製程中使用之純水)

Body：

Gelatin(明膠)

Sodium Lauryl Sulfate(硫酸月桂酯鈉)

Titanium Dioxide(二氧化鈦)

Purified Water(製程中使用之純水)

「作用」:

本品具有中樞性之鎮痛作用及末稍性抗炎症作用。

(1)動物試驗本品之鎮痛效果比 Aspyrin 及 Aminopyrin 強，抗炎症效果為 Aspyrin 之 2.5 倍，Aminopyrin 之 3.8 倍，約為 Phenylbutazone 之 0.5 倍。

(2)長期運用無習慣性，也沒有耽溺性。

(3)少數有下痢發生，有下痢發疹時請立即停藥。

(4)小白鼠之急性毒性經口為 1620±65mg/kg 腔腹為 5l0mg/kg 老鼠，狗等經長期投與時，僅略有食慾體重減輕之現象，血液及臟器等則無顯著之變化。

「適應症」:

神經痛、齒痛、月經痛、分娩後痛、頭痛。

「用法˙用量」:

通常成人初次服用 2 粒(500mg)以後每 6 小時 1 粒(250mg)，兒童依年齡症狀酌減。

本藥須由醫師處方使用。

「注意」:

本劑對老鼠、狗之實驗無催畸形作用發現然對妊婦之安全性仍未確定。

「貯存方式」:

室溫避光防濕保存。

「包裝」:

100 粒盒裝。

300、500 粒瓶裝。

1000 粒塑膠罐裝。

居禮化學藥品股份有限公司淡水廠

新北市淡水區忠山里中洲子 3 之 1 號