

鎮咳祛痰劑



作用 本藥含有鎮咳、祛痰、支氣管舒張以及抗組織胺成分，用於緩解咳嗽症狀，一般而言，服用後 20 至 30 分鐘後，會產生止咳效果，可以持續 3 至 4 小時，並且不會產生習慣性以及便祕等副作用

成分 每膠囊中含有
有效成分及含量

Brompheniramine Maleate	2.5 mg
Cloperastine HCl	20 mg
dl-Methylephedrine HCl	16.6 mg
Potassium Guaiacolsulfonate	80 mg

其他成分(賦形劑)

Corn Starch、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、French Chalk、
Hard Capsule Shell 1 (Gelatin、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Brilliant Blue FCF、Purified Water)
Hard Capsule Shell 2 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Purified Water)

用途 (適應症) 緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)

使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治： (a) 6 歲以下 (b) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人 (c) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病 (如慢性氣管炎或肺氣腫) 所引起之持續或慢性咳嗽的人 (d) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人 (e) 有心臟病及 65 歲以上的人
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生： (a) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦 (b) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品 (c) 服用鎮靜藥或安眠藥的人
- 其他使用上注意事項： (a) 為防止兒童誤食，請妥善保管 (b) 避免陽光直射 (c) 勿超過建議使用量 (d) 不得與酒精性飲料併用 (e) 不要服用本藥超過七日 (f) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械

用法用量 通常成人 1 次 1 粒，一日 3 次，飯後服用

警語 1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 若有任何不適情況產生 (b) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛
- 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日 (d) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐

包裝 10~1000粒 塑膠瓶裝、PTP 盒裝

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 衛署藥製字第 004739 號 | 電腦代號 DCA00 | ® 註冊商標

國際標準 PIC/S GMP 合格藥廠
回春堂製藥廠股份有限公司
台灣・桃園廠 桃園市新屋區中興路 988 號

DICA000_04