YSP

適胃康® 錠
Swecon® Tablets

SWT-006
衛署藥製字第05721號
制　酸　劑

胃內含有一種專門消化蛋白質的酵素，稱之為胃蛋白酶(Pepsin)。當胃內胃酸增多時可提升其消化蛋白質的能力，如果胃酸經常性過多，此酵素的消化力也會有過旺的現象，結果連胃、十二指腸壁本身的肌肉也被消化、侵蝕而形成潰瘍。
本藥能中和胃酸，緩解胃酸過多引起之不適。

【作　　用】
本藥含Magnesium Aluminum Hydroxide Carbonate Hydrate (Hydrotalcite)，其成分原料為極微細粉末，能在各種強度的胃液中與胃酸充分作用，而使胃液的pH保持於3～5之最適值。

【成　　分】
有效成分及含量：每錠中含
Magnesium Aluminum Hydroxide Carbonate Hydrate (Hydrotalcite)..500mg
單次劑量（2錠）之酸中和能力為24.0mEq以上，鎂含量為17.4mEq。
其他成分（賦形劑）：Saccharin Soluble、Sodium Starch Glycolate、Potato Starch、Microcrystalline Cellulose、Magnesium Stearate、Polyethylene Glycol 6000、L-Menthol、Povidone、Magnesium Aluminosilicate UFL2、Pineapple 51359/A、Milk D。

【用途（適應症）】
緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 3歲以下。
2. 消化道潰瘍的人。
3. 有腎臟疾病的人。
4. 腎衰竭病患（長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。）
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 與其他藥品併用時。
四、其他使用上注意事項
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 勿超過建議使用量。
3. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
4. 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年齡	使用量
成人及12歲以上	一天3～4次，或需要時服用，每次2錠。
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量的1/2（每次1錠）
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量的1/4（每次1/2錠）
3歲以下	請洽醫師診治

【警　　語】
一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	便祕、噁心、嘔吐、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
1. 有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包　　裝】
12～1000錠玻璃瓶裝、塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【保存上之注意】
1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【類　　別】
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【給消化系統異常患者的治療建議】
1. 少吃刺激性食物或飲料，如辛辣製品、酒精、咖啡、茶等。
2. 調整正常生活作息，減少過多的精神壓力。
3. 多攝取蔬菜與水果，補充足夠的纖維量以避免消化不良及便秘情形。
4. 避免不必要的藥物投與，如消炎鎮痛劑，以減少其對消化道的破壞。

YUNGSHIN®
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號