130.00 mm

150.00 mm

阿片樟腦酊
Camphorated Opium Tincture

衛署藥製字第 05863 號

主 成 份：每100毫升(100ml)含有
50毫克(50mg)無水嗎啡。

適 應 症：
鎮痛、鎮咳。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
100毫升含有無水嗎啡50毫克，密閉阻光容器儲存。
一 次 量：5～20毫升
一次極量：30毫升
一日極量：80毫升

性　　狀：
本劑為淡褐色芳香醇性液，與水混合則現乳光。

作　　用：
本劑內含阿片粉之作用類似嗎啡，作用於中樞神經系統，具鎮痛、鎮靜、止瀉作用；另含Papaverine有鎮痙作用、Noscapine等生物鹼會增強嗎啡作用。本劑可改善強烈下痢、咳嗽等症狀，抑制手術後腸管蠕動，及強烈疼痛之鎮痛、鎮靜及鎮痙。

使用時應注意事項：

一、一般應注意事項：

1.有可能產生藥物依賴性，使用時應注意觀察，小心投藥。連用中如急速減藥會有諸如流淚、流汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散瞳、頭痛、失眠、不安、譫妄、振顫、全身肌肉關節痛、呼吸急迫等禁斷症狀。

2.有嗜眠、眩暈等現象時，應禁止操作汽車、攪拌機等危險性工作。

二、下列情況之患者勿給藥：

1.嚴重呼吸抑制者。（因本劑會增強呼吸抑制）

2.支氣管喘息發作者。（因本劑會妨礙氣管分泌）

3.嚴重肝障害者。（因本劑有昏睡之副作用）

4.慢性肺部疾患併發心不全者。

5.痙攣狀態者。

6.急性酒精中毒者。

7.阿片生物鹼過敏者。

三、下列情況之患者應慎重給藥：

1.心、肝、腎、及呼吸機能障礙者。
2.腦部器具障礙者。
3.休克狀態者。
4.甲狀腺機能低下者。（如黏液水腫等）
5.有代謝性酸血（酸毒）症者。
6.副腎皮質機能低下者。
7.有藥物依賴之往歷者。
8.新生兒、乳幼兒、高齡者、衰弱者。
9.前列腺肥大致排尿障礙者。
10.器質性幽門狹窄，麻痺性腸塞痛等。

四、孕婦、授乳婦之給藥時應注意：

1.因嗎啡在動物試驗時有催畸性之報告，故於孕婦、授乳婦之給藥時，應在療效與危險性之間仔細評估。
2.分娩前給藥，產後新生兒會有多動、神經過敏、失眠、振顫等禁斷症狀。
3.分娩時給藥，產後新生兒會有呼吸抑制現象。
4.本劑會自母乳傳予幼兒，授乳婦應小心使用。

五、本劑與下列藥品併用又喝酒時會增強藥效，給藥時應特別留意：

Phenothiazine衍生物、Barbituric acid衍生物等中樞神經抑制劑、吸入性麻醉劑、Monoamine氧化酵素阻礙劑。三環系抗鬱劑、β－阻斷劑、Cumarine系抗凝血劑。

副 作 用：

偶有呼吸抑制（本劑引起之呼吸抑制可用那囉克松或Levallorphan等嗎啡拮抗劑拮抗之）、不整脈、血壓變動、嗜眠、眩暈、不安、錯亂、興奮、視調節障礙、譫妄、發汗、噁心、嘔吐、便祕、發疹、搔癢感、排尿障礙、顱內壓亢進、顏面潮紅等現象。

賦 形 劑：Benzoic Acid, Camphor, Anise Oil, Alcohol, Water Purified

包　　裝：本劑有500、3500毫升塑膠瓶裝。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
CENTER LABORATORIES INC.
地　　址：臺北市南港區園區街3之2號7樓
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)
廠　　址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
公司電話：(02)2655-8680　圖文傳真：(02)2655-8380
工廠電話：(03)598-1829　圖文傳真：(03)598-1820
CTRA-001 20150728　　14C09-D01