胃酸過多、消化性潰瘍治療劑　衛署藥製字 006833 號

“永吉”宏 胃 錠

Honwe Tablets〝Yung Chi〞

【劑型、成份】

每錠中含有：

主成分：

1.Dicyclomine HCl ----------5mg

2.Aluminum Hydroxide Gel Dried---400mg

3.Magnesium Oxide----------200mg

賦形劑：

4. Sodium Lauryl Sulfate

5. Methyl Cellulose

6. Sweetmint Powder

7. Sodium Saccharin

8. Potato Starch

9. Magnesium Stearate

【特　　徵】

1. 鎮痙、鎮痛作用：Dicyclomine HCl 為具有雙重之鎮痙作用，而可緩解平滑肌之痙攣及迅速的消除疼痛。

2. 制酸作用:本劑合理配合有速效性的 Mag. Oxide 及持續性的 Aluminum Hydroxide Gel Dried 因之能維持胃在最適之 pH 範圍內。

【適 應 症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、腸炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法、用量】

成人每次 1 錠，一日 3 次吞服或嚼碎服用，就寢前再服用 1 錠效果更佳，醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注 意 事 項】

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射,宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示,孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量,若有不適情況產生,應立即停藥就醫。

【警　　語】

一、含有制酸成分：

(一)除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

1.本藥每日最大建議劑量之乳糖含量超過 5g，對於牛乳或乳製品耐受度低者應小心服用或請諮詢醫師藥師藥劑生。

2.未滿 3 個月之嬰兒不得服用。

3.每日最大建議劑量之含鎂量超過 50mEq (0.6g)，腎疾患者不要服用。

4.本劑含制酸劑應注意下述警語：

(1)一天內不可服用超過一日最大劑量。也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(2) 制酸劑不得併用其他藥品。

(二)如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再服用。

(三)消化性潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

(四)含鋁之製劑成分注意：

1.本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕、偶有噁心、嘔吐。

2.腎衰竭病患長期服用鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis enecphalopapty)及低磷血症，應小心使用。

二、含有鎂之製劑請注意：

1.本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

【包　裝】

1000 錠罐裝

永吉製藥股份有限公司

屏東縣萬丹鄉萬丹路三段 91 號

電 話：(0 8) 7 7 7 2 2 9 1