4. 副作用：

(1) 休克：微有引起休克症狀之可能所以要徹底觀察病患，如發現不快感、口內異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴時應中止投與。

(2) 過敏症：發疹、蕁麻疹等 Allergy 症狀出現時，應中止投與。

(3) 血液：偶有紅血球、白血球減少，微有貧血，好酸球增多之現象出現，微有皮下、粘膜之出血傾向、出血現象出現之可能，如認爲有上列異常症狀時，應中止投與。

(4) 肝臟：偶有 S-GOT，S-GPT，AL-P 上昇現象。

(5) 腎臟：偶有 BUN 上昇現象。

(6) 大量投與：類似化合物 (含 Na 之 Penicillin 系藥劑) 之大量投與，有引起痙攣、肺水腫、浮腫等報告。麻醉之貓以大量急速靜脈內投與 (500mg/kg)時，有一時性之血壓下降之報告，因此需要大量靜脈內投與時，儘可能緩慢注射之。

(7) 中樞神經：腎不全患者大量投與時，有引起痙攣等神經症狀出現之可能。

(8) 胃腸：偶有噁心、嘔吐，微有食慾不振、下痢等胃腸症狀出現。

(9) 其他：微有引起口內炎、舌炎、菌交代現象、發熱等之可能。

5. 適用上之注意

(1) 靜脈內投與有引起血管痛之可能，故注射部位及注射方法等宜格外注意，注射速度儘可能緩慢。

(2) 因與 Gentamycin 混合，有不活性化作用，宜避免混注投與。

(3) 溶解後儘速使用之。如需保存亦需於24小時內使用。

6. 其他之注意

投與本劑時，宜定期作肝機能、腎機能、血液等檢查。

〔貯　　存〕室溫保存

〔有效期限〕檢定合格之次月起三年。

		【包　　裝】		
Lilacillin	注射劑 1 g (力價)	1 Vial	10Vials	50Vials
Lilacillin	注射劑 2 g (力價)	1 Vial	10Vials	50Vials
Lilacillin	注射劑 5 g (力價)	1 Vial	10Vials	

委託製造者：台灣武田藥品工業股份有限公司
台北市南京東路三段217號7樓
TEL:(02)2712-1112

製 造 廠：中國化學製藥股份有限公司
台中市工業區15路10號

® 註册商標（武田藥品工業株式會社授權）

D2　　TS