外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"利達"得舒爽注射液 4毫克/毫升	申請廠商	利達製藥股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製字 第 007682 號	106. 5. - 3	

合成副腎皮質荷爾蒙製劑　　DXV

〝利達〞

衛生福利部 騎縫章 食品藥物管理署

得舒爽注射液 4 毫克/毫升

Dexason Injection 4mg/ml 〝Lita〞

【成　　份】每 ml 含
主成份：Dexamethasone 21-Phosphate disodium Salt----------4mg
賦形劑：Propylene Glycol(Eq to1,2-Dihydroxypropane)(Eq to 1,2-Propanediol)
Benzyl Alcohol
Trisodium Citrate Dihydate
Sodium Hydroxide(For PH Adjustment)
Hydrochloric Acid(For PH Adjustment)
Water For Injection

【優　　點】1.對 Cortisone 或 Hydrocortisone 療法而發生浮腫時，可改用本劑。
2.對 Cortisone 或 A.C.T.H.劑治療不能得到優良效果或因副作用不能繼續治療時，本劑可奏效。

【適 應 症】風濕性關節炎、風濕熱、紅斑性狼瘡等之膠原病。
強直性脊椎炎、骨關節炎、痛風性關節炎等之關節炎症。
支氣管氣喘等過敏性疾患。

【用 法 用 量】肌肉注射，靜脈注射，每人每次：2~10mg ，一日一次。
關節腔內，軟組織內：每次 0.8~6mg。
皮下注射：每次 0.025mg。
結膜下：每次 0.4~2mg。
視年齡症狀可適宜增減。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 急慢性感染症使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品，以治療感染症病。
2. 對消化管障礙如胃腸潰瘍，務必特別注意。
3. 因主要副作用引起浮腫、血壓上昇是以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時有增加藥量的必要，請注意。
5. 對於有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間充分補充蛋白質。
絕對禁忌：精神病、消化管潰瘍、對抗生素治療無效而必須手術之感染症。
比較的禁忌：心血管疾病、腎臟機能不全、糖尿病、閉塞性靜脈炎、骨質疏鬆症、癆擊性疾患、結核。
7. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
8. 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內 (intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

【儲　　存】25℃以下避光儲存。

【包　　裝】1 毫升、10 毫升小瓶裝，100 支以下盒裝。

衛署藥製字第 007682 號

Lita Corp. 利達製藥

委託者：
利達製藥股份有限公司
台中市大甲區岷山里中山路1段906號　消費者服務專線04-26872345
製造廠：
瑞士藥廠股份有限公司新市廠　　台南市新市區中山路182號

4 711457 270934

※外文仿單應檢附中文譯文