“中生”鎂佳胃懸浮液

My-Gel Suspension “cBc”

鎂佳胃懸浮液含有制酸及去泡劑，具檸檬與薄荷香味；本品之特點是中和胃酸，保持適當之pH值，消除氣泡，減少腹脹。

本品之制酸劑，係採用氫氧化鋁、氫氧化鎂、及聚二甲矽氧烷(去泡劑)。一般而言，制酸劑之功能在於中和胃酸分泌過多。

成分中氫氧化鋁具有吸附、收斂之特性，氫氧化鎂係為局部作用而非全身性的一種制酸劑，聚二甲矽氧烷在腸胃內之作用係為改變氣泡之表面張力，解除胃腸氣脹。

【主要成分】：

Each ml contains:

Dimethylpolysiloxane ---------- 4.0 mg

Magnesium Hydroxide ---------- 40.0 mg

(as Magnesium Hydroxide paste---------- 129.0 mg)

Aluminium Hydroxide ---------- 40.0 mg

(as Aluminium Hydroxide gel---------- 264.7 mg)

單次劑量(10 ml)之酸中和能力不小於19.4456mEq，鎂含量為13.72mEq。

【賦形劑】：Mabit, Xanthan Gum, Hydroxyethyl cellulose, Saccharin Soluble(=Saccharin Sodium), Butylparaben, Propylparaben, Sorbitol Solution, Strawberry, Menthol, citric acid, Propylene Glycol, Water Purified

【適應症】：

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【用法用量】：

一天3次，或需要時服用。成人每次10ml(1包)，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次5ml(1/2包)；3歲以上未滿6歲，每次2.5ml(1/4包)；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

五、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

六、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【警語】：

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。

(二)未滿3個月之嬰兒不得服用。

(三)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(四)本藥不得併用其他藥品。

二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

六、本藥含碳酸鹽之制酸成份，可能引起腹脹、打嗝。

【包　　裝】60-4,000毫升塑膠瓶裝、6-400包鋁箔袋盒裝(每包10毫升)

衛署藥製字第007804號

【製 造 廠】

中生生技製藥股份有限公司淡水廠

CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.

廠　　址：251新北市淡水區埤島里行忠路120號

服務專線：(02)8631-0018

SCD-137
01