cGMP 優良藥品　　衛署藥製字第 008768 號

綜 合 感 冒 劑

風　　引 顆　粒

Foning Granules

本劑是一種綜合感冒劑，凡感冒之症狀如咳嗽、頭痛、發燒、關節痛、肌肉酸痛等服用本劑，可發揮各成分功效，達到緩解的故果。

【成分】每公克中含有:

Acetaminophen……..100mg

Ethoxybenzamide……75mg

Caffeine……..12.5mg

DL-Methylephedrine HCl……5mg

Dextromethorphan HBr……..……7.5mg

【賦形劑】

Sodium Isoascorbate、Starch、Sucrose、Tartrazine（FD&C Yellow No.5）、Alcohol、Sodium Saccharin、Strawberry Essence Powder、Purified Water、Sodium Glutamate、Sodium cyclamate。

【作用】

Acetaminophen:是一種解熱鎮痛劑。

Ethoxybenzamide:具解熱鎮痛作用。

DL-Methylephedrine HCl:擴張支氣管幫助痰之喀出，而能緩解咳嗽。

Dextromethorphan HBr:一種鎮咳劑。

【適應症】

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、咳嗽、喀痰)。

【用法用量】

一日 3 次，飯後半小時內服用為宜。18 歲以上每次 2g（1 包）。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：

（一）孕婦及授乳婦不建議自行使用。

（二）服用本藥時不得併服其他藥品。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

五、不得併服含酒精飲料。

【警語】

一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

二、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

（一）18 歲以下不建議自行使用。

（二）曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。

三、患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，

應先請教醫師藥師藥劑生。

四、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。

五、若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

六、吸菸、慢性阻塞性肺疾病（患），如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。

七、不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。

八、不要服用本藥超過七日。

九、服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。

十、服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有

高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

十一、酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為可能造成肝損害及胃出血。

十二、本藥含水楊酸類藥物，除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

（一）本藥不得使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群（Reye's Syndrome）。

（二）曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。

十三、本藥含水楊酸類藥物，故蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency）患者，不得服用本藥。

十四、本藥含水楊酸類藥物，故懷孕第三期婦女不得使用。

十五、服用 Monoamine oxidase inhibitor（MAOI）或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑（Selective serotonin reuptake inhibitors（SSRI））者，不得使用含 Dextromethorphan 之本藥。

十六、本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

十七、本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：

（一）應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

（二）為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【包裝】

6~500 包鋁箔袋盒裝（每包 2 公克）。

【儲存條件】

25℃以下儲存。

cGMP 聯邦 UNION 優良藥品

聯邦化學製藥股份有限公司

台北縣蘆洲市正和街 19 號