

易而善 感冒膠囊

EARSHUN Cold Capsules

【成份】每1膠囊含：

Acetaminophen	240mg
Salicylamide	200mg
dl-Methylephedrine Hydrochloride	10.6mg
Ascorbic acid	16.6mg
Chlorpheniramine maleate	2.5mg
Caffeine anhydrous	25mg

【適應症】

緩解感冒之各種症狀（咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、打噴嚏、鼻塞）。

【用法用量】

成人1次1粒，7~15歲1次1/2粒，一日三次，飯後服用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

1.須置於小孩接觸不到之處。為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

5.除非醫師藥師藥劑生指示，服用本類藥品時不得併服其它藥品。

6.不得併服含酒精飲料。

警語：

1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

2.除非醫師藥師藥劑生指示，3歲以下不建議自行使用。

3.除非醫師藥師藥劑生指示，曾經因藥物引起過敏症狀者，不得使用。

4.若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

5.吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本類藥品。

6.服用含抗組織胺之本類藥品後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類藥品。

7.除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患勿服用含抗組織胺之本類藥品：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

8.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。

9.不要服用本類藥物超過七天。

10.服用本類藥品後，如果症狀沒有改善，或症狀併隨有發燒、或發燒持續三天，應停藥立即就醫。

11.服用本類藥品後，如果喉嚨疼痛持續二天以上，並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

12.服用本類藥品應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心臟過速。

13.本藥含有支氣管擴張成份，除非醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

14.除非有醫師藥師藥劑生指示，本藥不得使用於兒童或20歲以下青年少年之水痘或流行性感冒症狀之解除，因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群(Reye's Syndrome)有相關性。

15.曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫缺乏症，Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不得服用本藥。

酒精警語：

若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師你是否能服用Acetaminophen或其鎮痛解熱劑，因為Acetaminophen可能造成肝損害及胃出血。

※包裝：6~1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

中華民國台灣陽生製藥工業股份有限公司台灣屏東
屏東市龍華路381號

