



“永信”

多喜黴素 Doxymycin

DOC-003
衛署藥製字第009654號

膠囊

Capsules "Yung Shin"

多喜黴素係一種半合成四環素類抗生素，具有與四環素類相同的抗菌譜，但其抗菌作用力比一般四環素類強，血中濃度亦高，半衰期又長，而有持久的抗菌效能，每日僅服藥一次即可獲得比其他每日需服多次的四環素藥物較為優越的治療效果。

【成分】 每膠囊中含：

Doxycycline Hydrochloride.....100mg(Potency)

【賦形劑】

Lactose、Talc、Silicon Dioxide Colloidal、Magnesium Stearate、Capsule #2 (Glycerol、Sodium Laureth Sulfate、Iron Oxides (Yellow)、Brilliant Blue FCF)。

【特徵】

1. 本藥主要抗菌作用為抑制細菌的蛋白合成，對多數的革蘭氏陽性及陰性菌有效，其抗菌範圍與四環素類抗生素雷同。
2. 本藥經口服用，吸收率高達90%以上，而近於完全的吸收，同時可與食物或同服而不失它的作用，由於完全的吸收而減低了它在下腸部一般抗生素所易造成的副作用—下痢。
3. 本藥對組織親和性強，在感染處及組織內的濃度甚高。更由於不尋常的半衰期長達22小時，而具更久的抗菌作用，一天一次的單劑量即可得到長達24小時的作用，對上、下呼吸道，皮膚及結締組織，泌尿生殖系統均有優異的臨床效果。

【適應症】

革蘭氏陽性菌、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

【用法用量】

通常成人開始治療的第一天服用2粒，此後每天服用1粒（首日之2粒可一次服用，也可分成二次，隔12小時服用一次），若用以治療嚴重的病例時亦可使用每日2粒之劑量直至痊癒為止。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 本藥口服時可能導致嚴重的肝臟或腎臟變壞，故在使用本藥前及使用期間內應作肝腎機能及血尿酸之檢查(Blood Urea Nitrogen determination.)，在發現對肝腎有副作用發生時，當即停止使用或予適當治療，則常可恢復正常。
2. 如患者腎臟機能有障礙時，僅以口服或非口服常用劑量，即可導致藥物體內蓄積量超過及可能發生肝臟中毒，在此狀況下，應使用比正常量為少之劑量，如治療須延長時，應注意測定血清中四環素濃度。
3. 發現有過敏現象時應即停止使用。
4. 治療期間同時觀察有否促成抗生素有之無感受性菌之生長（尤以白色念珠菌之感染），如發現則酌量服用或借他法防止之。
5. 本藥禁用於已知對四環素類抗生物質有過敏性反應者。
6. 光敏度(Photo-allergy)的病人在本藥治療期間應避免日光直射，如發現皮膚不適應立即停藥。
7. 使用本藥很少有副作用，但噁心、嘔吐、腹瀉、陰道炎、皮膚炎、舌炎、胃炎、直腸炎亦偶可發現。
8. 治療應繼續至徵候及熱度消失為止，並應注意停用本藥後其有效抗菌力仍可維持24~36小時。
9. 氫氧化鋁凝膠(Aluminum Hydroxide gel)可減低本藥之吸收，故禁忌同時使用。

【新生兒、乳幼兒之投與】

1. 出現牙齒著色，珐瑯質形成不全，骨骼發育不全等，故只在其他藥劑無效時，才考慮使用本藥。
2. 偶有出現頭內壓上昇之現象（嘔吐、大胸門膨隆、頭痛、血乳頭等）。

【孕婦之投與】

妊娠後半期投與本藥，胎兒會有一時性骨骼發育不全、牙齒著色、珐瑯質形成不全等現象。又經動物實驗認為對胎兒具有毒性，故孕婦或可能懷孕之婦人投與本藥時須判斷在治療上之有益性大於危險性時才使用。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

4~1000粒Alu. Foil鋁箔盒裝、塑膠瓶裝、鐵罐裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140730