

【仿單】

治咳錠 ANTI-COUGH Tablets

本藥須由醫師處方使用 衛署藥製字第 011317 號

【成分】每錠中含有：
Dextromethorphan Hydrobromide 30.0 mg
賦形劑：
Lactose、Magnesium Stearate、Potato Starch、
Microcrystalline Cellulose 102、Purified Water

【適應症】鎮咳(感冒、支氣管炎、支氣管擴張症、起因之咳嗽)。

【用法用量】通常成人每次 1/2 ~ 1 錠，一日 1 ~ 4 次服用。

【注意事項】由於會有催眠的作用，投與中之患者要注意避免從事架車及操作機械等危險動作。

【禁忌】1.對本劑曾產生過敏症之患者。
2.MAO 抑制劑投與中之患者。

【相互作用】在國外曾有和 MAO 抑制劑(Phenelzine)併用，而導致痙攣、反射高進、異常高熱、昏睡等症狀出現的報告，故應避免併用。

【副作用】1.精神神經系：睡意、偶有頭痛、眩暈、罕有不快、不眠等現象。
2.消化器：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、腹痛、罕有口渴、噯氣等現象出現。
3.過敏症：若有發疹等過敏症狀出現時，應中止用藥。
4.其他：罕有呼吸抑制的情形出現。

【高齡患者之投與】由於高齡者之生理機能較低下，因此要注意減量。

【處理上之注意】以水劑配合時，因和碘化鉀、碘化鈉等配合時，會生成難溶性的碘化氫鹽，此外和碳酸氫鈉、小茴香氫醌等配合時，會有游離之鹽基析出，故應避免此類配合。

【儲藏條件】請於 25°C 以下保存，且於有效期限內使用。

【包裝】1 ~ 1000 錠塑膠瓶裝。

LT-T114

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號