〔成分〕
Each Capsule Contains:
Acetaminophen 100mg
Ethoxybenzamide .. 83.3mg
Noscapine 5mg
DL-methylephedrine HCl 5mg
Chlorpheniramine Maleate 1.25mg
Caffeine Anhydrous 15mg

衛署藥製字第12330號

批　號：
製造日期：
有效期間：

"威力"
感冒膠囊
Non-pyrine Common Cold
Capsules "Wei Li"

威力化學製藥股份有限公司
台南市北區開元路60號

〔適應症〕
緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發熱、頭痛、關節痛、肌肉酸痛）。

〔用法用量〕
一日3次。飯後半小時內服用為宜。18歲以上，每次2粒。
醫師藥師藥劑生指示藥品
注意事項、警語：
請詳閱說明書後使用

134mm

194mm

綜合感冒劑

"威力" **感　冒** 膠囊

Non-pyrine common Cold Capsules "Wei Li"

本劑對於感冒症候群之解熱、鎮痛、鎮咳、祛痰有緩解功效。

【成分】：每膠囊含：

Acetaminophen 100mg	Ethoxybenzamide 83.3mg
Noscapine 5mg	dl-Methylephedrine HCl 5mg
Chlorphenirmaine Maleate 1.25mg	Caffeine Anhydrous 15mg

【適應症】：緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發熱、頭痛、關節痛、肌肉酸痛）。

【用法用量】：一日3次。飯後半小時內服用為宜。18歲以上，每次2粒。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
   (一)孕婦及授乳婦不建議自行使用。　(二)服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量。若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

【警　　語】：
1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
   (一)18歲以下不建議自行使用。　(二)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
3. 患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
7. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
8. 不要服用本藥超過七日。
9. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
11. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因可能造成肝損害及胃出血。
12. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
   (一)本藥不得使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群(Reye's Syndrome)。
   (二)曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
   (三)蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不宜服用本藥。
   (四)懷孕第三期婦女不得使用。
13. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
   (一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
   (二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
14. 本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
15. 本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：
   (一)應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
   (二)為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【包　　裝】：12-1,000 粒塑膠瓶裝
衛署藥製字第 12330 號
儲存條件：室溫（15-30℃）儲存

威力化學製藥股份有限公司
台南市北區開元路 60 號