

胃酸過多・消化性潰瘍治療劑

金 胃 錠

KingWei Tablets

(衛署藥製字第012340號)

今日的社會，人們事業忙碌，精神緊張，暴飲暴食，過勞等不規律的生活，易引起許多胃腸疾患，諸如胃痛、胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等。

本劑特選定能緩和胃腸神經緊張並抗痙攣作用之 Dicyclomine Hydrochloride, Scopolamine-N-butyl Bromide, 精神安定劑Chlordiazepoxide Hydrochloride及具有速效且長效的制酸劑 Magnesium Oxide, Hydroxide Aluminium Magnesium Co-Dried Gel, Synthetic Aluminium Silicate 等幾種成份，經合理配合，使本品之治療作用更為完善，並發揮迅速的功效，實為理想之制酸劑及消化性潰瘍治療劑。

每錠含：

【主成分】

Dicyclomine Hydrochloride.....	2.0mg
Scopolamine-N-Butyl Bromide.....	2.0mg
Chlordiazepoxide Hydrochloride.....	5.0mg
Sodium Copper Chlorophyllin.....	3.0mg
Hydroxide Aluminium Magnesium Co-Dried Gel.....	350.0mg
Magnesium Oxide.....	40.0mg
Synthetic Aluminium Silicate.....	60.0mg

【賦形劑】

Saccharin Sodium, Lactose, Starch,
Magnesium Stearate, Menthol

【作用】

1. Dicyclomine Hydrochloride 及 Scopolamine-N-butyl Bromide 對作用於胃腸等腹部臟器之副交感神經，有緩解痙攣，除去疼痛等作用，並且能調節胃液分泌及胃腸蠕動。
2. Chlordiazepoxide Hydrochloride 能緩解精神緊張，除去精神不安，抑制異常興奮，使胃腸在舒適的狀態，並具有食慾增進之作用。
3. Sodium Copper Chlorophyllin 對於潰瘍發生之部份，有肉芽新生之促進作用，而促進潰瘍面迅速的復元。
4. Hydroxide Aluminium Magnesium Co-Dried Gel, Magnesium Oxide 及 Synthetic Aluminium Silicate 等制酸劑之配合，使制酸效果迅速且持續，並具有胃腸粘膜之覆蓋保護作用。

【適應症】

胃、十二指腸潰瘍，胃痛，胃酸過多，胃痙攣，急慢性胃炎。

【用法・用量】

1. 胃、十二指腸潰瘍：成人一日3~4次，每次2錠，服至痊癒。
2. 胃痛、胃痙攣、胃酸過多：成人一日3~4次，每次1~2錠，症狀發生時服用，如有週期性的疼痛症狀時，先預測發作時間而服之。
3. 急慢性胃炎(暴飲暴食、過酸症狀等引起者)：成人一日3~4次，每次1~2錠，症狀消失後，暫時繼續服用更佳。
4. 本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 服用本劑時請勿飲酒。
2. 老年人患有嚴重之心臟病者，如需服用本劑請醫師特別指示。
3. 孕婦應避免使用。
4. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥，可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【包裝】 瓶裝：50錠，60錠，100錠，120錠，150錠，500錠。

委託者： 葡萄王生技股份有限公司

台灣桃園市中壢區龍岡路三段60號

製造廠：美西製藥有限公司

高雄市仁武區工業一路九號

總經銷：凱成股份有限公司