解熱鎮痛劑

〝居禮〞阿斯匹靈錠100毫克

ASPIRIN Tablets 100mg〝Curie〞

衛署藥製字第12401號

【成 分】每錠內含Aspirin……100mg

【適應症】

退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

【用法用量】

發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每24小時內不可超過4次。飯後半小時內服用為宜。成人每次4錠，12歲以上適用成人劑量；12歲以下兒童，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

5. 不得併服含酒精飲料。

【警語】

1. 使用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。

2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。

3. 服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。

4. 成人不得連續使用本類製劑超過7天，小孩不得超過3天，視情形需要，繼續使用本類製劑前，請洽醫師。

5. 懷孕第1、2期婦女：除非醫師藥師藥劑生指示，不得自行使用。懷孕第3期婦女：不得使用。

6. 不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。

7. 本藥不得使用於12歲以下兒童，亦不得使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—雷氏症候群（Reye's Syndrome）有相關性。

8. 蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency）患者，不得使用本藥。

9. 本藥含Aspirin，應注意下列事項：

(一)除非有醫師藥師藥劑生指示，曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之

患者，不得使用本藥。

(二) 可能引起胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、出血傾向、氣喘、耳鳴等不適症狀。

【貯存方式】

30℃以下貯存。

【包裝】

8~1000 錠塑膠瓶裝。

居禮化學藥品股份有限公司淡水廠
新北市淡水區忠山里中洲子 3 之 1 號