“英城”胃舒服錠

Machaf Tablets

衛署藥製字第12586號

「胃舒服」係對胃腸悉心綜合結果，使多種藥劑發揮效能且易於服用之胃腸藥。

【成　份】每一錠含有：

Guaiacol Carbonate	35mg
Creosot	10mg
Scopolia Ext.	1.5mg
Pulvis Coptidis	10mg
Pulvis Rhei	20mg
Pulvis Scutellaria	20mg
Berberine Chloride	10mg
Neusilin(Metamagnesium Aluminium Silicate)	30mg

【作　用】：

1.本劑之 Neusilin (Metamagnesium Aluminium Silicate)具制酸作用，可改善胃、十二指腸潰瘍、胃炎、上部消化道機能異常之症狀。

2.本劑之 Scopolia extract 具鎮痙、鎮痛作用，可改善胃酸過多、胃炎、胃、十二指腸潰瘍、痙攣性便秘等之胃酸分泌，過動亢進及疼痛。

【適 應 症】：

醱酵性下痢、一般下痢、胃腸炎、大腸炎、胃酸過多、胃痛、腹痛。

【用法用量】：

一天三次，飯後服用．成人一次二錠．8歲~15歲一次一錠．5歲~8歲一次1/2錠。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注　意】

1.對本劑中之任何成份過敏者，禁用之。

2.青光眼、前列腺肥大引起排尿障害、嚴重心疾患之病人，禁用之。

3.腎障害、心機能障害、甲狀腺亢進、潰瘍性大腸炎及高鎂血症病人，愼重投與。

4.消化管內，體液之ph值上升會影響本劑之吸收、排池，故避免長期與 alkline劑併用。

5.本劑中之 Scopolia Extract 可能引起視調節障害、散瞳、畏光，故使用後若從事駕駛或操作機械等危險性工作應小心謹愼。

【注意事項】：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非醫師藥師藥劑師生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警　語】：

1.除非醫師藥師藥劑師生指示，請遵循下列情況服用。

① 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。

② 未滿三個月之嬰兒不得服用。

③(1) 一天內不得服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(2) 制酸劑不得併用其他藥品。

2.如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

3.消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

4.除非有醫師藥師藥劑師生指示，請遵循下列情況服用。

① 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。

② 急性腹瀉不得使用超過48小時。

③ 6歲以上小孩、或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似疾患者不得自行使用。

④ 本藥含收斂成分，不得自行使用於帶有嘔氣、腹痛、腹部膨脹等症狀之急性下痢。

5.本藥含止瀉成分可能引起便祕。

6.(1) 腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。

(2) 不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。

【儲　藏】：貯存於避光、緊密之容器內。

製造商：衛達化學製藥股份有限公司
台中市工業區２３路２１號
委託者：英城藥品股份有限公司
台中市文心路三段1027號5FB室

(28)
處
政