

“政德” 益止痢錠

BERBENOL TABLETS “GENTLE”

益止痢錠係以具有制止腸內腐敗發酵及對腸內病原菌具有殺菌作用的 Berberine chloride 配合具有局部收斂作用的 Albumin tannate 以除去炎症、抑制分泌，此外更配合殺菌劑 Acrinol 以增強對腸內病原菌之殺菌作用。

成 分：每錠含：

主成分：

Albumin tannate.....50mg

Berberine chloride.....25mg

Acrinol.....12.5mg

賦形劑：

Starch

Lactose

Aluminium Magnesium silicate

Avicel

Silicon dioxide

Talc

Magnesium Stearate(eq.to Stearas Magnesium)

作 用： Berberine chloride-具有腸內腐敗發酵的制止作用，膽汁分泌作用，增進胃腸蠕動作用，以及消炎殺菌作用，能抑制各種傳染病原菌之繁殖，尤其對大腸性腸炎，及腸內異常發酵甚具療效。

Acrinol-具有殺菌作用，對阿米巴性赤痢、細菌性腸炎頗具效果。

Albumin tannate-係局部收斂劑，在腸內與胰液作用，徐徐變為鞣酸鹼以發生收斂作用，鞣酸使蛋白質凝固，在腸粘膜形成一層不溶性之披膜以除去炎症、抑制分泌，具有收斂防腐作用。

適應症：下痢、腸內異常發酵、急慢性腸炎及細菌性腸疾患(赤痢、腸炎)粘液性下痢。

用法用量：一天3至4次，或需要時服用。但服用間隔應在4小時以上。

12歲以上，適用成人劑量。6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警 語：一、除非有醫師、藥師、藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

1.對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。

2.急性腹瀉不得使用超過48小時。

3.6歲以下小孩、或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似疾患者不得自行使用。

4.本藥含收斂成分，不得自行使用於帶有嘔氣、腹痛、腹部膨脹等症狀之急性下痢。

二、本藥含止瀉成分可能引起便秘。

三.腹瀉最重要的治療是水分與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。

四.不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。

包 裝：50's、100's、200's、500's、1000's 塑膠瓶裝

儲 存：儲存於25°C以下



政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號

