衛署藥製字第 013679 號

"瑞士"

# 林可黴素 注射液

# Lincomycin Injection "SWISS"

林可黴素（Lincomycin）是由 Streptomyces lincolnensis var lincolnensis 所產生之抗生物質，其特長是對革蘭氏陽性菌具有特別強力之殺菌效果，且與 penicillin, ampicillin, cephalosporins, tetracycline, chloramphenicol 及 streptomycin 之間無交叉抗藥性關係，又以試管或活體試驗得知細菌對 Lincomycin 產生抗藥性甚為不易，因之本注射液對由革蘭氏陽性菌，特別是對其他抗生物質發生抗藥性之 streptococci, pneumococci 和 staphylococci 等引起之感染症特具卓效。

**【成　　分】**Each ml contains：

Lincomycin Hydrochloride……300mg（potency）

賦形劑：Benzyl Alcohol、Water For Injection

**【藥理作用】**Lincomycin 對革蘭氏陽性菌及陰性球菌具有抗菌作用。與 penicillin, Ampicillin, cephalosporins, tetracycline, chloramphenicol 及 streptomycin 之間無交叉抗藥性關係，又 Lincomycin 耐性菌之發生亦甚不易，一次肌肉注射 600mg，於 30 分鐘內即達到最高血清濃度，Lincomycin 600mg 加入 500ml 5%的葡萄糖溶液中，以 2 小時以上時間施行靜脈輸注，所產生的治療濃度可持續 14 小時。

**【適 應 症】**葡萄球菌、鏈球菌、肺炎双球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

**【主治效能】**①扁桃腺炎、咽頭炎、支氣管炎、肺膿瘍、肺化膿症、膿胸。

②副鼻腔炎，中耳炎，乳樣突起炎、耳下腺炎。

③敗血症、細菌性心內膜炎、產褥熱，髓膜炎、腦膿瘍。

④骨髓炎、蜂窩織炎、癰、疔、膿痂疹、皮膚感染症、化膿性關節炎、乳腺炎、淋巴腺炎、丹毒。

⑤猩紅熱、眼化膿症、匐行性角膜潰瘍。

⑥尿道炎、膀胱炎、腎盂炎。

⑦手術中、手術後感染防止。

**【用法用量】**肌肉注射：成人每日 1～2 次，每次 2ml。

小孩每日 1～2 次，每次 10mg/kg。

靜脈注射：成人每日 1～2 次，每次 600～1000mg 以 5%注射用葡萄糖液 100ml 稀釋後點滴。

本藥限由醫師使用。

**【儲存條件】**請儲存於 25℃以下。

**【包　　裝】**10ml/vial × 10vial/Box .50Vial/Box。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路 182 號