



副腎皮質荷爾蒙劑 衛署藥製字第 014170 號

## “永吉”的剎美剎松錠

### Dexamethasone Tablets “Yung Chi”

本品對於儂麻質斯關節炎，Allergy 性疾患等有優於同類製劑之治療效果，而且副作用比同類製劑更是少發現，由於用量少，所以電解質之代謝異常現象殆不發生，亦不發生肝 Glycogen 蓄積作用，因此對於儂麻質斯性關節炎、過敏疾病、發炎等治療深受醫界所樂於使用。

#### 【成份】

每錠中含：

主成分：

1. Dexamethasone-----0.5mg

賦形劑：

2. Lactose

3. Microcrystalline Cellulose

4. Sodium Starch Glycolate

5. Tartrazine

6. Magnesium Stearate

7. Talc

#### 【特徵】

1. 本劑有強力之抗炎症性、抗儂麻質斯性、抗過敏性作用。
2. 本品作用均為 Cortisone 之 35 倍，Prednisolone 之 7-10 倍，所以少量即可得效果。
3. 用量少對電解質代謝殆不影響，所以水鈉之阻留比 Cortisone、Prednisolone 更少可說殆不發生。
4. 本品在所訂治療量下，對血壓殆不發生影響，亦極少誘發消化潰瘍。
5. 對於使用 Cortisone、Hydrocortisone、Prednisolone 無效之病例，改用本劑亦有效。

#### 【效能】

儂麻質斯性疾患、過敏性疾患、膠原病、炎症性皮膚疾患、炎症性眼疾患。

#### 【用法、用量】

通常成人一日 1.5~3.0mg，維持量一日 0.5~0.75mg，分 3~4 次服用或分為早、晚 2 次飯後服用，依年齡、症狀、疾患而適量減之。本藥須有醫師處方使用。

#### 【注意事項】

1. 長期治療後中止使用，必須漸漸減量。
2. 急慢性感染症時，請同時併用適當之化學療法劑或抗生素藥品。
3. 有消化器障害者，應注意使用。
4. 禁忌疾患：精神病、重病精神神經病、或活動性消化性潰瘍、抗生素無效之感染症。
5. 妊婦或可能懷孕之婦女應慎重投與。
6. 投與期間應補充蛋白質。
7. 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升、尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
8. 糖尿病患者使用時，請注意增加 Insulin 之用量。

【包 裝】

1000 錠 塑膠瓶裝

永吉製藥股份有限公司

屏東縣萬丹鄉萬丹路三段 91 號

電 話：(08)7772291