



副腎皮質荷爾蒙劑

BET-005
衛署藥製字第14227號

“永信”

貝他每松 錠

Betamethasone

Tablets
"Yung Shin"



3.98cm

多少年來Prednisolone一直是glucocorticoid的主流，廣泛用於支氣管性氣喘、類風濕性關節炎、滑囊炎、異位性皮膚炎、痛風性關節炎、紅斑性狼瘡等疾患均有著治療效果，但其鈉及水分滯留作用多多少少限制了它的臨床應用（如高血壓症），因此科學界對於作用力強，副作用少的衍生物之探尋更是不遺餘力，遂有Betamethasone之問世。

Betamethasone即9 α -fluoro-16 β -methylprednisolone，C9 α 導入氟更增強其glucocorticoid作用力，而C16 β 上導入甲基則減少了其鈉及水分滯留的不良現象，使得本藥比Prednisolone理想、完美、適用於抗炎症、抗風濕症與抗過敏症之臨床應用。

【成 分】每錠中含：

Betamethasone.....0.5mg

【賦形劑】

Lactose、Microcrystalline Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

【特 徵】

1. 本藥之療效高：根據很多篇文獻報告的統計，絕大多數病人使用本藥之後，其病情不論在主觀上或客觀上均有改善。
2. 本藥之劑量小：本藥之常用劑量比Prednisone、Prednisolone、Methylprednisolone、Triamcinolone、Paramethasone都來得小，尤適於糖尿病患者之使用。

【適應症】

急慢性風濕熱、風濕性關節炎、支氣管氣喘、肌炎、皮膚炎、濕疹、火傷。

【用法·用量】

通常成人初期劑量為每日1.5~3.0mg，維持劑量為每日0.5~1.5mg，分2~4次於每餐後及就寢前服用或早晚服用之，俟症狀好轉之後每隔2~3日，其一日劑量減少0.25~0.5mg，以決定最低有效量，以此當作最低維持量至症狀完全消失為止。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

曾對本藥或其他皮質類固醇產生過敏反應之患者禁用本藥。

【一般注意】

1. 必要時，本藥於停藥前應採逐漸減量方式並觀察停藥後情形。
2. 長期使用本藥之患者，在治療期間內可能需限制食餌（鈉之攝取量），或補充鉀質及蛋白質。
3. 患有水痘或麻疹者（尤其是兒童）應避免服用本藥。
4. 糖尿病患者使用時，請注意增加Insulin之用量的必要。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

主要副作用包括視力模糊，糖尿病，局部刺激性，過敏反應，浮腫，血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應小心用藥。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

6~1000錠玻璃瓶、塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140268