衛署藥製字第 14418 號

"新喜"抗胃優錠

KOWELL-U TABLETS "N.C.P."

本藥須經醫師處方使用

本劑中之主成分 Methylmethionine Sulfonium Chloride 係於 1950 年，由 Chency 氏從生甘藍汁中發現之(Antipeptic ulcer dietary factor(抗潰瘍因子)或別稱 Vitamin U 為新型胃十二指腸潰瘍及胃炎之治療劑。且由於具 Labile-CH_3 基於 Active-S 基，對肝機能，代謝改善及肝細胞具有良好的作用。加上 Aluminum Silicate 等制酸劑的適度配合，對消化性潰瘍有良好之治療效果。

【成分】每錠中含有：

有效成分及含量：Vitamin U.....25mg
Sodium Copper Chlorophyllin 5mg
Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel ..100mg
Dihydroxyaluminum Aminoacetate 100mg
Synthetic Aluminum Silicate.....100mg
Glycyrrhizin 10mg

賦形劑：Menthol、Starch、Magnesium Stearate、Mannitol

【作用】

1. Methylmethionine Sulfonium Chloride (Vitamin U)可促進 E.Coli 的生長，且有潰瘍組織之再生作用(增進肉芽發育，防止細小動脈內膜之肥厚，閉塞等)。
2. Sanalmin(Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel)在胃內可與過剩之胃酸中和，因不像碳酸氫鈉之會發生二氧化碳，故不引起二次性之酸分泌現象，且其被吸收於血液中之量甚少，不產生鹼中毒。又因形成膠狀，故可均勻地分散於胃內，造成廣大之吸著面積，中和多量之胃酸。
3. 內服後，可在潰瘍處形成一保護膜以避免胃酸之刺激，有粘膜保護作用，且作用時間持久為其優點。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【用途(適應症)】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多、胃炎胃痛。

【用法用量】

通常成人每日服用 3 次，每次 1~2 錠，並可視症狀適宜增減之。

【警語】

(一)除非有醫師藥師藥劑生指示，請依循下列情況服用：
1. 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
2. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
3. 制酸劑不得併用其他藥品。
(二)如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
(三)消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
(四)本藥含鋁之制酸成分：
1. 本藥含鋁之制酸劑成分可能引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
2. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。
(五)本藥含鎂之制酸劑成分可能引起腹瀉。

【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝。

【儲存條件】:

室溫(15~25℃)儲存。

新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號