

“嘉信”

見大黴素 注射液 40 公絲/公撮

Gentamicin Injection 40mg/ml

見大黴素是一種放線菌屬的水溶性注射液，本製劑相當安定，不須冰冷貯藏，Gentamicin Sulfate，是一種殺菌作用的抗生素，能抑制敏感細菌之正常蛋白質的合成，使菌體之生長受影響。在生物體內廣泛的對致病菌包括 G(+)及 G(-)菌具有效力如 Pseudomonas aerugi-nosa, Indole-positive 及 Indo-negative proteus sp. 皆有效，Escherichia coli, Klebsiella-Enterobacter-Serratia sp. 葡萄球菌屬(包括對 Penicillin-methicillin 產生耐藥性者)以及 Neisseria 淋菌。在臨床上對 Aminoglycoside antibiotics (Kanamycin, Neomycin, Paromycin) 具有抗藥性之細菌，本劑依然有效。

成分：每 ml 含
主成分：
Gentamicin Sulfate40mg(Potency)
賦形劑：
E.D.T.A.
Sodium Bisulfite
Methyl paraben
Propyl paraben
Water for Injection

適應症：

革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

效能：

Gentamicin 在臨床上對下列感染症很有效：Pseudomonas aeruginose, Proteus sp.(Indole positive 及 Indole-negative) Neisseria gonorrhoea, Escherichia coli, Klebsiella -Enterobacter-Serratia sp. 和 Staphylococcus(包括對其他抗生素產生耐藥性之菌種)。主要用來治療下列各症：

1. 呼吸道感染症：肺炎、支氣管肺炎、胸膜炎、肋膜炎、腫瘍。
2. 尿道感染症：急慢性腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎。
3. Bacteremia 菌血症。
4. 男女性淋菌尿道炎。
5. 外傷感染。
6. 胃腸道感染。
7. 婦科及外科感染症：腹膜炎、化膿性流產、火傷併發敗血症。
8. 其他：腦膜炎、敗血菌、新生兒菌血症。

用法用量：

通常成人一次 40~80mg(1~2ml)一日 2~3 次；小孩依每公斤體重一天 3~5mg 分 2~3 次行肌肉注射。在嚴重情況下可行靜脈注射，單一劑量先以生理食鹽水或 5% 葡萄糖液稀釋濃度不得超過 1mg/ml，此稀釋液以 1~2 小時速度行點滴注射。不可與他藥混和注射，若需要時宜分開注射之。本藥限由醫師使用。

注意事項：

1. 曾有腎機能障礙或長期使用或高劑量使用之患者，可能會引起聽覺障礙。
2. 經常使用導致聽覺障礙或腎中毒的藥物如 (Streptomycin, Neomycin, Kanamycin, Cephaloridine, Viomycin, Polymycin B 和 Polymycin E(Colistin) 則有引起聽覺障礙之危險。
3. 若發生神經肌障礙或呼吸麻痺時可以用神經肌抑制劑如 Succinyl choline 或 Tubocuraine，鈣或 Neostigmine 來解除此現象。
4. 使用本劑治療時可能會導致非敏感性菌之過度繁殖，若發生宜採適當之治療。
5. 過量或中毒反應時可藉腹膜透析或血透析來幫助自血中排出，此方法對腎機能障礙者尤為重要。
6. 使用於孕婦方面，其安全性尚未被證實。

包裝：

2ml×1V、2ml×10V、10ml×1V、10ml×5V

委託者/嘉信藥品股份有限公司

嘉義市劉富街 60 號

製造廠/政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號