

“嘉信” 林可黴素注射液 300 毫克/毫升

Lincomycin Injection 300mg/ml “C.S.P”

衛署藥製字第 014750 號

【成分】：每 ml 含：

主成分：

Lincomycin hydrochloride300mg(Potency)

賦形劑: Sodium hydroxide、Benzyl alcohol、Water for injection

【適應症】：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎鏈球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【效能】：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎鏈球菌、腦膜炎菌、破傷風桿菌、自喉菌、壞疽桿菌等引起之感染症。

1. 扁桃腺炎、咽頭炎、支氣管炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸。
2. 鼻腔炎、中耳炎、耳下腺炎。
3. 敗血症、細菌性心內膜炎、產褥熱、髓膜炎。
4. 骨髓炎、蜂窩組織炎、疔、膿痂疹、皮膚感染症、化膿性關節炎、乳腺炎、淋巴腺炎、丹毒。
5. 猩紅熱、眼化膿症、角膜潰瘍。
6. 尿道炎、膀胱炎、腎盂炎。
7. 手術後預防感染。

【用法用量】：

通常成人一日一次 600mg(力價)或 300mg 一日二次，重症場合可增加至 600mg 一日二次，小孩依每公斤體重 10mg 一日一次，重症場合可增加至二次。靜脈注射成人一次 600mg，每 8~12 小時一次，小孩每公斤體重 10~20mg，分 2~3 次，以 5% 葡萄糖液或生理食鹽液 20ml~分鐘以上徐徐靜注，或以 200~500ml 5% 葡萄糖液或生理食鹽液稀釋形點滴注射。本藥限由醫師使用。

【注意事項】：

1. 偶有嗜中性血球減少，白血球減少及顆粒白血球缺乏等之副作用。
2. 對 Clindamycin 過敏之病人不可使用。
3. 本品不適用於肝、腎、內分泌或代謝之病歷患者。
4. 使用於孕婦應注意。
5. 有嚴重並持續下痢之現象，應停止用藥。

【包裝】：

2ml、10ml 小瓶，100 支以下盒裝。

委託者/嘉信藥品股份有限公司

嘉義市劉富街 60 號

製造廠/政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號