

"嘉信" 的剎美剎松 注射液 2 公絲/公撮  
Dexamethasone Phosphate Injection 2mg / ml "C.S.P."

「成分」：每 ml 含

主成分：

Dexamethasone Sodium Phosphate

Eq. to Dexamethasone Phosphate.....2mg

賦形劑：

Benzyl alcohol

Water for injection

「組成」：

本劑每 ml 中含有主成分 Dexamethasone Sodium Phosphate 2mg，為衍自 Prednisolone 之合成腎上腺類固醇。

「作用及特點」：

本劑之抗炎作用強於 Prednisolone 5-10 倍及 Cortisone 30 倍，故可用少量而獲致良效。  
對於 Cortisone 或 ACTH 劑治療不能得到優良效果時，或因副作用不能繼續治療時，以本劑治療即可奏效。  
長期之 Cortisone，Hydrocortisone 療法而發生浮腫時，改用本劑。  
由於其對水之溶解度大，故藥效很快，肌肉或靜脈注射後 15~30 分及具效。

「適應症」：

風濕性疾患、關節炎、痛風、支氣管氣喘、過敏性疾患、紅斑性狼瘡及皮膚疾患。

「用法用量」：

每日使用量成人一次 1mg ~2mg，一天 1-2 次，肌肉皮下注射或靜脈注射。本藥限由醫師使用。

「警語及注意事項」：

1. 急慢性感染症使用時請同時併用其他化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾患。
2. 對胃腸潰瘍患者之使用須特別注意。
3. 糖尿病患者使用時有增加 Insulin 藥量之必要。
4. 因主要副作用為引起浮腫，血壓上升，對高血壓、腎臟疾患之使用須注意。
5. 對於有精神病因素之患者亦須注意。
6. 使用本劑期間須充分補充蛋白質。
7. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
8. 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

「包裝」：2mlx10 玻璃小瓶、10mlx10 玻璃小瓶

「儲存」：室溫 25°C 以下儲存



委託者：嘉信藥品股份有限公司  
嘉義市劉富街 60 號

製造者：政德製藥股份有限公司  
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號