鎮痛　　解熱劑　　衛署藥製字第 015199 號

〝政德〞必寧爾痛錠

PYRININ TABLETS 〝Gentle〞

必寧爾痛錠係以菲比林系中樞性解熱、鎮痛劑 Acetaminophen 配合 caffeine。

成　分　：每錠含

主成分：
Acetaminophen…….. 500mg
Caffine anhydrous…….. 20mg
賦形劑：
Corn starch
PVP K30
Food yellow color NO.4
Magnesium Stearate
Talc
Sodium starch glycollate primojel

效　能：

Acetaminophen—具有解熱鎮痛雙重效果與 Aspirin 相同，但對 Aspirin 過敏的患者，本品可適用 。口服吸收，能使痛覺閥值上昇，升局疼痛界限，又使末梢血管擴張導致流汗，具鎮痛解熱作用，正常時對體溫無影響，本品毒性低，胃腸障礙少。

caffeine—能擴大腦血管緩和腦血管之緊張，調整血流，提高對腦細胞之滲透性。

適應症：

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、關節痛、咽喉痛、神經痛、肌肉痠痛、月經痛)。

用法用量:

發燒或需要時服用，若症狀持續，則每 4-6 小時可重複服用，成人每次 1-2 錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量，每 24 小時內不可超過 4 次。

12 歲以上，適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2；3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量 1/4；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

本藥醫師、藥師、藥劑生指示藥品。

注意事項：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存陰涼之處。
3 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師、藥師、藥劑生。
5.不得併服含酒精飲料。

警　語：

1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。
2.除非有醫師、藥師、藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
（1）3 歲以下不建議自行使用。
（2）曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
3.服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。
4.成人不得連續服用本類製劑超過 7 天，小孩不得超過 3 天，視情況需要，繼續服用本類製劑前，請洽醫師。
5.酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。
6.本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮失眠、且會常引起心搏過速。

包　裝:

2-1000 錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

儲　存:

本藥品請置於緊密容器，儲存於 25℃以下。

政德製藥股份有限公司
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號