衛署藥製字第 015473 號

"台裕" 林可黴素注射液

Lincomycin HCl Injection "Tai Yu"

"台裕"林可黴素注射液為無菌之 Lincomycin HCl 注射用水溶液。

Lincomycin HCl 為由 Streptomyces lincolnensis 所得之抗生素。

【成　　分】

Each ml contains：

Lincomycin HCl.....300 mg (potency)

【作　　用】

1. 本品抑制感受菌之蛋白質合成，呈抑菌性及殺菌性(高濃度)藥效。
2. 對 Streptococci、Pneumococci、Staphylococci 等所引起之瘡、蜂巢組織炎、癰疽、丹毒、膿痂疹、乳腺炎、肺炎、肺化膿症、淋巴結炎、骨髓炎、髓膜炎、細菌性心內膜炎、敗血症、猩紅熱、中耳炎、副鼻腔炎、腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎、支氣管炎、扁桃腺炎、咽頭炎、子宮附屬器炎等有效。

   因進入 cerebrospinal fluid (CSF)量甚少，故不用於腦膜炎。
3. 本品注射後吸收快速而完全。吸收後廣泛分佈於大部份體液(CSF 除外)及組織中，於骨、膽及尿中均呈高濃度；易進入胎盤，可達母體血中濃度之 25% 。在體內經肝代謝，半衰期為 4~5.4 小時(腎功能不全者為 10~13 小時，肝功能不全者為 9 小時)。

【適 應 症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】

本藥限由醫師用。

1. 成人：

   肌肉注射，每十二小時至二十四小時一次，每次注射 600mg (potency)。靜脈注射，每八小時至十二小時一次，每次注射 600mg~1gm (potency)。每日最大量靜脈注射 8.4gm (potency)。靜脈注射時將一次劑量以 5~10% Dextrose Inj.，5~10% Dextrose and 0.9% Sodium Chloride Inj.，Ringer's Inj.，M/6 Sodium Lactate Inj.，6% Dextran and 0.9% Sodium Chloride Inj. 等稀釋為 1gm (potency)/100ml 或以下，緩慢靜脈注射一小時或以上。
2. 兒童：

   一個月以下嬰兒不建議使用。

   一個月以上者：肌肉注射，每十二小時至二十四小時一次，每次注射 10mg (potency)/kg 體重。靜脈注射，每八小時一次，每次注射 3.3~6.7mg (potency)/kg 體重;或每十二小時一次,每次注射 5~10mg (potency)/kg 體重。

【注意事項】

1. 對本藥有過敏往歷者應慎重投與。
2. 本品不可與 Novobiocin，Kanamycin 混合後使用。
3. 本品可進入胎盤，蓄積於胎兒肝臟；並可排泄於乳汁。孕婦及授乳婦用藥時應就其治療利益與可能危害審慎考慮。
4. 本品可能引起之副作用有腹部或胃痙攣、痛、膨脹，或偽膜性大腸炎腹瀉血便，偶有發燒、噁心、嘔吐、口唇乾燥、倦怠虛弱、皮疹等，應即停藥。
5. 肝或腎功能障礙者、高齡者、有大腸炎往歷者、過敏性支氣管喘息往歷者，應審慎使用。

【賦形劑】

Sodium Metabisulfite、Benzyl Alcohol、Sodium Citrate Hydrous、Citric Acid、Sodium Bisulfite、Sodium Hydrosulfite 、Sodium Chloride、Edetate Disodium 、Water for Injection。

【儲存方法】

25℃以下避光貯存。

【包　　裝】

10ml、20ml 小瓶，100 支以下盒裝。

台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL：(03)5826655　　FAX：(03)5822389

Ⓓ