制酸劑

“威力”胃爽錠

Wei San Tablet “Wei Li”

成　　分：每錠含

Dried Aluminum hydroxide gel ····· 230mg

Magnesium hydroxide ····· 85mg

適 應 症：

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

單次劑量（2錠）之酸中和能力為12.11mEq，鎂含量為5.83mEq。

用法用量：

一天3至4次，或需要時服用，應嚼碎後吞服。成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 腎衰竭病患長期服含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性軟骨化症（Dialysis Osteomalacia）透析性腦病變（Dialysis encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。

警　　語：

㈠除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

1. 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
2. 未滿3個月之嬰兒不得服用。
3. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
4. 本藥不得併用其他藥品。

㈡如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

㈢消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

㈣本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

㈤本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

㈥本藥含碳酸鹽或碳酸氫鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

衛署藥製字第16196號

包　　裝：12-1,000 錠塑膠瓶裝

儲存條件：室溫15-30°C儲存

威力化學製藥股份有限公司
台南市開元路６０號