# "應元"去氧羥四環素膠囊

## Doxycycline Capsule"Y.Y."
## 衛署藥製字第016227號

「性質」：

"應元"去氧羥四環素膠囊主要成份為Doxycycline HCl，是一廣效性抗生素，對G(-)，G(+)立克次氏體，病原菌(Mycoplasma)，特別是引起肺炎及其他呼吸道感染症的病原菌之一的Mycoplasma pasumonial，皆有良好效果，口服後吸收迅速，3小時即可達到最高之血中濃度(2mcg/ml)，半減期長，故每天僅需口服一次，即可維持有效之血中濃度，另外Doxycycline HCl具有優異之脂肪親和力(及組織滲透力)，不受食物或牛乳的影響，可以不必顧及用膳之時間，隨時可服用，服後能自血中迅速地擴散於各種不同的組織中，而且可以維持長時間的高組織濃度，24小時後有21.6%，48小時後有60% 被由尿中排出體外。

「成份」：Each capsule contains:

Doxycycline HCl　　125mg(potency＝100mg)

「適應症」：

革蘭氏陽性、陰性菌、立克次體及巨型濾過性病毒感染症。

「作用」：

1.淺性化膿性疾患(扁桃炎、咽頭炎、智齒周圍炎、膿痂疹、膿瘍瘡、癤疽、毛囊炎、麥粒腫、眼瞼膿瘍、淚囊炎、創傷及火傷感染、手術後感染症)。

2.深性化膿性疾患(乳腺炎、淋巴節炎、骨髓炎)。

3.支氣管炎、支氣管肺炎、支氣管擴張症。

4.赤痢。

5.膽管炎、膽囊炎。

6.尿路感染症(腎盂炎、腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎)。

7.前立腺炎。

8.淋病。

9.猩紅熱。

10.結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍。

11.中耳炎、副鼻腔炎、唾液腺炎。

「用法用量」：

成人初劑量一日服用200mg，維持量一日服用100mg。

兒童初劑量一日服用4mg/kg，維持量一日服用2mg/kg。

可依症狀適宜增減。(本藥須由醫師處方使用)

**「注意」：**

**1.口服:間有噁心、嘔吐、軟便、肛門周圍炎、口內炎、舌炎、口角炎、下痢。另外如有過敏症狀再生不良性貧血，應即停藥。**

**2.有腎障礙者，會起積蓄作用，需注意投藥量。**

**3.由於腸內菌叢之變化障礙菌交代現象，而起念珠菌屬症。故於長期給藥時需補給Vit B群。**

**4.超過有效期間而仍使用者，引起Fanconi症候群(嘔氣、嘔吐、全身倦怠、蛋白尿、糖尿代謝性酸中毒)。**

「包裝」：

10cap’s,100cap’s,500cap’s,1000cap’s。

應元化學製藥股份有限公司
台南市新忠路26號　TEL:(06)2654883(代表號)