衛署藥製字第 017283 號

過敏性疾患治療劑

"壽元"膚體寧錠

Futilin Tablets" S.Y. "

【成份】

每錠中含有：

Chlorpheniramine Maleate	2.5 mg
Riboflavin	2.5 mg
Pyridoxine HCl	2.5 mg
Biotin	0.125 mg
Nicotinamide	5 mg
Calcium Pantothenate	10 mg
Glycyrrhizine	6.25 mg

賦形劑：Magnesium Stearate, Corn Starch, Lactose, Avicel, Sodium Starch Glycolate, Hisil, Calcium Phosphate Dibasic, Hydroxypropyl Cellulose.

【作用】

Vitamin H (Biotin)係 1916 年 Bateman 所發現,其後由 Gyorgy 等因其俱有皮膚(Haut)因子，故名之為 Vitamin H。先前已知大黑鼠缺乏本成分未引起類脂漏性皮膚炎，最近證實其對脂漏性皮膚炎、濕疹、急性炎症性皮膚炎等均有良好之效果，在皮膚科領域中，以新內因性皮膚疾患治療劑而受到注目。

Ribolfavin, Pyridoxine HCl 均屬於 Vitamin B 群，亦可稱為抗皮膚炎維他命，實驗證實缺乏之則可發生脂漏性皮膚炎、口角炎、口唇炎等，據報導與 Vitamin H 併用有相乘之治療效果。

Nicotinamide, Cal. Pantothenate 對濕疹、蕁麻疹、各種皮膚炎，均有療效。

Cal. Pantothenate 與 TCA 循環有關，有保護肝臟解毒作用，對藥疹、中毒疹亦有效。

Glycyrrhizine：係強肝解毒劑，已有肝保護作用之成分，與本品其他有皮膚保護作用之成分，而對皮膚病特別是中毒疹皮膚炎有優越之療效。

Chlorpheniramine Maleate 皮膚病中由食物性感染性等引起之過敏性皮膚病，相當多，特別是蕁麻疹幾乎均源於過敏性，本成分係針對此項過敏性皮膚疾患奏效，並迅速改善症狀而配合。

【適應症】

緩解過敏性鼻炎，枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢，皮膚癢疹。

【用法、用量】

一天 3-4 次，每次一錠。指示用藥。

【副作用】

思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。

【注意事項】

1.須置於小孩接觸不到之處。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【警語】

1.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

2.老年人應小心使用本劑，2 歲以下不建議服用。

3.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大

引起之排尿困難患者，請勿服用此藥。

4.服用此藥不得與酒精性飲料合用。

5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

6.服用本藥後，勿駕車或操作危險器械。

【包裝】

50 錠、100 錠、500 錠、1000 錠瓶裝。

委託者：壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路 128 號
製造廠：明大化學製藥股份有限公司
台中縣外埔鄉水美村水美路 52 號