

“濟時”

利痛寧 錠(安西諾隆)

Litonin Tablet (Triamcinolone)

本品是 Prednisolone 之新衍生物，效力迅速，無礦物質代謝障礙之副作用，服用本品不必限制食鹽之攝取，亦不必考慮鉀之補給，而按常用量服用時，對血壓亦無影響。

【成份】

Each tablet contains :

Triamcinolone.....4mg

【賦形劑】

Lactose、Starch、Food Color Yellow No. 4、Magnesium Stearate

【適應症】

類風濕性關節炎、痛風、支氣管氣喘、阿狄森氏病、膠原病、炎症性眼疾患、過敏性疾患。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

飯後及就寢時服用。

開始劑量每日 2~4 片(8~16mg)分 3~4 次服用，當得到良好反應後，則每 2~3 日減少 2mg，直至減少到最小量而能維持患者得相當為止。

【注意事項】

1. 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
2. 對消化管障害，如胃腸潰瘍，務請特別注意。
3. 因主要副作用，引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時，有增加 Insulin 藥量的必要者請注意。
5. 對有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間，請充分補充蛋白質。

【包裝】

50、100、500、1000 粒瓶、盒裝。

委託者：

濟時藥品股份有限公司

台南市中西區民權路二段 158 號 4 樓

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路 182 號