

“景德”

# 安比西林 膠囊500公絲

## Ampicillin Capsules 500mg

### "Kingdom"

本品Ampicillin是一種廣效性的半合成青黴素，其抗菌範圍很廣，對青黴素G有感受性的革蘭氏陽性菌有效外，對大部分易致病的革蘭氏陰性菌亦有效，因Ampicillin具對革蘭氏陰性菌之殺菌力，使它補助了Penicillin G對此之不足，而成為青黴素群之最優良者，其殺菌範圍包括：

革蘭氏陽性菌：無青黴素酶葡萄球菌、肺炎雙球菌、溶血性和非溶血性鏈球菌、梭菌屬，以及大多數的腸球菌。

革蘭氏陰性菌：淋病奈氏菌、腦膜炎奈氏菌、流行性感嗜血菌、帶狀桿菌、奇異變形桿菌，以及許多沙門氏菌、志賀氏菌和大腸菌。

Ampicillin在酸性液中安定，口服後極易被吸收，服用後兩小時，可達血中最高濃度，故能發揮最高療效。藥效可持續6小時，服用劑量30-40%由尿中排出。

#### 【主成分】每粒膠囊含

Ampicillin.....500mg (力價)

【適應症】葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

作用於：

全身感染症：由葡萄球菌、鏈球菌、肺炎菌等革蘭氏陽性菌及大腸桿菌、沙門氏菌、變形桿菌等革蘭氏陰性菌所引起者。

呼吸道感染症：肺炎、支氣管炎、膿毒性喉痛、咽頭炎。

泌尿道感染：由大腸桿菌、變形桿菌、糞鏈球菌所引起者，如尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎。

淋病：由淋菌所引起者。

胃腸道感染症：由沙門氏菌、志賀氏菌、大腸桿菌等引起者如傷寒、下痢、腸炎。

腦膜炎：由腦膜炎球菌、嗜血流行性感、大腸桿菌所引起者。

#### 【用法用量】

成人每6小時服用一次，每次服用一粒，小孩每公斤體重每日25-50mg，每6小時平分服用一次。嚴重感染者量可酌增，宜於飯前半小時至一小時服用。本品須由醫師處方使用。

#### 【注意事項】

- 1.如有過敏現象，則不宜使用。
- 2.本劑因被青黴素酶不活化，凡產生青黴素碟妓芽莖P染症，皆不適用。
- 3.治療期間，應定期作肝、腎臟及造血機能檢查。  
(尤其兒童及嬰兒應用本品時)

#### 【賦形劑】

Magnesium Stearate、Talc

#### 【膠囊殼成分】

Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine

#### 【儲存】

請保存於乾燥陰涼處（15℃-30℃）

#### 【包裝】

1000粒以下瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第017859號

委託者：景德製藥股份有限公司

台北市中山北路二段113號8樓

製造廠：榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路三段447號

40417002 ②