

黃氏

美治寧錠(每基歐寧)
Methionine Tablets "H.S."

肝臟在人體內各種代謝器官中甚為重要，肝臟能將各種營養素變成動物澱粉而貯藏，並可將體內產生之有害物質及來自體外之毒物予以解毒，當人體罹患疾病或飲酒過量，致肝機能衰弱，則全身營養，即不能充分分配，解毒機能亦能低下，因此不但肝機能障礙，全身亦將引起種種病症，如疲勞感、宿醉、食慾不振、肩酸、頭痛等症狀，本劑即為促進肝臟之功能，強化解毒機構。本劑主成分 Methionine 同時具有抗脂肪肝作用(Lipotropic Action)能防止肝臟脂肪之沈著及肝臟硬化，本品分子中之甲基與體內 Ethanol amine 作用而生成膽素，膽素再與脂肪酸、甘油、磷酸作用而成磷脂質被吸收後使肝臟機能正常化。

【成分】

Each Tab. Contains :

Methionine.....500mg

賦形劑:

Silicon Dioxide, Starch Corn, Ethyl Cellulose,
Povidone, Calcium Carboxymethyl Cellulose,
Magnesium Stearate。

【適應症】

急慢性肝炎、流行性肝炎、肝硬變、脂肪肝。

【用法用量】

通常成人一次一錠，一日三次，飯後服用，可依年齡症狀適宜增減。
本藥須由醫師處方使用

【包裝】 50 粒、100 粒、200 粒、500 粒、1000 粒塑膠瓶裝。

 [®] PIC/S GMP 藥廠
黃氏製藥股份有限公司
SINCE 1961 雲林縣斗南鎮大同路444巷11號

"黃氏"

美治寧 錠 (每基歐寧)
Methionine Tablets "H.S."



® PIC/S GMP 藥廠

黃氏製藥股份有限公司
雲林縣斗南鎮大同路444巷11號

Lot No.:
Exp. Date:

Tab.

【成分】Each tab. Contains:
Methionine..... 500mg

【適應症】

急慢性肝炎、流行性肝炎、肝硬
變、脂肪肝。

【用法用量】

通常成人一次一錠，一日三次，
飯後服用，可依年齡症狀適宜增
減。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第017983號



T-85

"莫氏"
美治寧 錠
(每基歐寧)
Methionine
Tablets "H.S."

促進肝臟機能

【成分】 Each tab. Contains:
Methionine.....500mg
【賦形劑】
Silicon Dioxide, Starch
Corn, Ethyl Cellulose,
Povidone, Calcium
Carboxymethyl Cellulose
Magnesium Stearate.

強化肝臟解毒
抗脂肪肝

【適應症】
急慢性肝炎、流行性肝炎、肝硬
變、脂肪肝。
【用法用量】
通常成人一次一錠，一日三次，
飯後服用，可依年齡症狀適宜增
減。
本藥須由醫師處方使用

"莫氏"
美治寧 錠
(每基歐寧)
Methionine
Tablets "H.S."

Lot No:
Exp. Date:

 PIC/S GMP 藥廠
莫氏製藥股份有限公司
SINCE 1981 雲林縣斗南鎮大同路444巷11號

"莫氏"
美治寧 錠
(每基歐寧)
Methionine
Tablets "H.S."

衛署藥製字第017983號

