衛署藥製字第**018095**號

“三東”胃平鎮錠

Weipintin Tablets “S.T.”

醫師藥師藥劑生指示藥品

【成分】Each Tablet Contains:

Aluminum Hydroxide Dried Gel…….. 200 mg
Magnesium Aluminum Silicate……. 200 mg
Dimethicone…….. 25 mg

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【用法用量】

單次劑量(1錠)之酸中和能力不小於6.9 mEq、鎂含量為1.56 mEq。

一天4次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次1錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次½錠；3歲以上未滿6歲，每次¼錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

1. **為防止兒童誤食請妥善保管。**
2. **避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**
3. **除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。**
4. **勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。**
5. **腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。**

【警語】

1. **除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：**
   - I. **對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5 g。**
   - II. **未滿3個月之嬰兒不得服用。**
   - III. **一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。**
   - IV. **本藥不得併用其他藥品。**
2. **如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。**
3. **消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。**
4. **本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。**
5. **本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。**
6. **本藥含碳酸鹽或碳酸氫鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。**

【包裝】8~1000錠塑膠瓶裝。

【貯存】請存放在室溫25℃以下保存，並放置在孩童無法取得處。

委託者

三東生物科技股份有限公司
台南縣佳里鎮禮化里 247 號

製造廠

N.W. cGMP
內外化學工業股份有限公司
雲林縣斗六市斗六工業區復興路 3 號