

“井田”胃可樂® 錠

WEICOLA® Tablets "Chinteng"

【作用特性】：

- 1.本品具有Atropine-like鬆弛神經緊張性及Papaverine-like緩解平滑肌痙攣顯著作用，雙重的效果於臨床上，具緩解胃腸管的痙攣、胃、十二指腸潰瘍。
- 2.本品具有中樞性鎮靜作用，能疼痛引起的精神神經不穩，並具有中樞性神經的鎮靜作用，對於慢性神經性胃痛、腹部不快具治療效果。
- 3.本品能調節胃酸，中和過多的胃液，應用於胃酸引起之腹痛、消化不良。

【成分】：每錠含：(Each tablet contains):

主成份：Homatropine methylbromide.....2.5mg
 Phenobarbital.....8mg
 Dried aluminum hydroxide gel.....320mg
 Ethyl aminobenzoate.....64mg
 Sodium Copper Chlorophyllin (Cu-Na chlorophyllin) (賦形劑).....0.9mg
 Magnesium Stearate(賦形劑).....2mg

【賦形劑】：Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Mannitol、Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Talc、Orange Powder、Starch Pregelatinized (Prejel)、Corn Starch Dried、Hisil、L-Menthol、Stearic acid、Purified Water.

【適應症】：急慢性胃痛、上腹部疼痛、胃、十二指腸及幽門痙攣、胃、十二指腸潰瘍、胃機能不正常蠕動、胃酸過多。

【用法用量】：成人一回一錠，餐前服用一日三次。 本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】：(一)本藥品禁用於2歲以下之嬰幼兒。

(二)本藥品禁用於benzocaine成分藥品過敏之病人。

【注意事項】：(一)腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥，可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Ost-eomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

(二)本藥品含benzocaine成分，可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症(methemoglobinemia)之不良反應。若在用藥後發生虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色，可能是變性血紅素血症之症狀，請立刻停止用藥，立即就醫。

(三)本藥品不宜大量或大體表面積使用，盡可能以可達預期療效之最小劑量使用。

(四)本藥品應小心謹慎用於兒童。

(五)民眾在貯放該類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用藥品。

(六)應遵循仿單(藥品說明書)相關內容使用。倘若於用藥期間有任何不適或疑問，應諮詢醫師或藥事人員。

【不良反應】：對於Barbiturates類藥品具高度敏感性病人之不良反應主要為過敏反應，包括局部腫脹(localized swelling)、紅斑性皮炎(erythematous dermatitis)。在極少數情形下，使用phenobarbital成分藥品的病人可能會發生剝落性皮炎(exfoliative dermatitis)的不良反應，如史蒂文生氏一強生症候群(Stevens-Johnson syndrome)及毒性表皮壞死溶解症(toxic epidermal necrolysis)等，嚴重可能會導致死亡。

【儲存】：本品請置於室溫25°C以下，並避光存放。

【包裝】：6~1000粒塑膠瓶裝、罐裝、鋁箔盒裝。



PIC/S G.M.P. 認證&國際ISO 9001驗證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

PIC/S G.M.P. 台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號



天下生物科技股份有限公司 總代理

台灣台中市大甲幼獅工業區工九路九號

諮詢專線：(04)26815757