

綜合感冒劑  
治 感 安 液  
Gyganan Solution

主要成分：Each ml contains：

賦型劑

Acetaminophen.....12mg	Sucrose.....216mg	Sodium Dehydroacetate .....0.5mg
Chlorpheniramine Maleate.....0.11mg	Lemon Essence..0.001ml	Caramel.....1.5mg
Guaiacol glyceryl ether..3.7mg	Purified Water add to	1 ml
Caffeine Anhydrous.....1.8mg		

適應症：緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咯痰)。

用法用量：一日3次，12歲以上，適用成人劑量，成人每次10ml，11-8歲5ml，8-5歲3.5ml，5-3歲2.5ml，醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

一、為防止兒童誤食請妥善保管。二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。三、除非有醫師藥劑生指示，請注意下列事項：

(一)孕婦及授乳婦不建議自行使用。(二)服用本劑時不得併服其他藥品。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。五、液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

六、不得併服含酒精飲料。

警語

一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

二、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。

三、患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。

四、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。

五、若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

六、吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。

七、不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。八、不要服用本藥超過七日。

九、服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。

十、服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

十一、酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。

十二、本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：

(一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類之藥品。

(二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

十三、本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：

(一)應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。

(二)為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。(三)12歲以下兒童不建議使用。

警語及注意事項：加刊

(一)肝毒性：1.使用 Acetaminophen(Paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部分發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的 Acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 Acetaminophen 成分之藥品。

2.過量服用 Acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 Acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。3.有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 Acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 Acetaminophen 或 Paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 Acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的 Acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

(二)與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 Acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(三)過量：1、服用過量 Acetaminophen 會在24小時內看到初期症狀，包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

2、本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。3、Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48-72小時才明顯可見。

(四)過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 Acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 Acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(五)嚴重皮膚反應：使用 Acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文斯氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

包裝：10-4000毫升瓶裝

貯存條件：通常貯存於室溫(常溫25°C)，並避陽光直射

衛署藥製字第018613號

委託者：峰揚新生物有限公司

地址：彰化縣彰化市平等街13號1樓

製造廠名稱：正長生化學製藥股份有限公司

地址：彰化縣和美鎮彰美路二段6號