副腎皮質荷爾蒙劑　　衛署藥製字第 018670 號

"政德" 的剎美剎松 注射液 4 公絲/公撮

DEXAMETHASONE Injection 4mg / ml "Gentle"

Dexamethasone 係屬於 glucocorticoid 之一種具有糖質代謝作用、抗炎症、抗 Rheumatic 及抗過敏作用，效果比 Prednisolone 強 7~10 倍，比 Hydrocortisone 強 20~25 倍，用量少即可獲得臨床效果，在普通用量不會引起電解質代謝異常，不會因鈉水之貯留而引起浮腫及體重增加，對使用其他副腎皮質荷爾蒙不能獲得預期效果時或因副作用不能繼續治療時使用本劑可奏效。本品副作用少，在臨床上幾乎與 Betamethasone 有相同療效。

本品製成無痛性水溶液注射液可迅速達高血中濃度，適於應付緊急症狀 Glucocorticoid 療法的嚴重過敏反應，因傷害所致之急性腎上腺機能不全以及各種原因所致之休克。

「成分」：每 ml 含

主成分：

Dexamethasone Sodium Phosphate

Eq. to Dexamethasone Phosphate……4mg

賦形劑：

E.D.T.A, Sodium Sulfite , Benzyl alcohol, Water for injection

「適應症」：

風濕性關節炎、風濕熱、紅斑性狼瘡等之膠原病、骨關節炎、強直性脊椎炎、痛風性關節炎及支氣管氣喘等過敏疾患。

「用法用量」：

通常成人每次 2 ~10mg(0.5~2.5ml)，一日一次行肌肉或靜脈注射。本藥限由醫師使用。

「警語及注意事項」：

1. 急慢性感染症使用時請同時併用其他化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾患。
2. 對胃腸潰瘍患者之使用須特別注意。
3. 糖尿病患者使用時有增加 Insulin 藥量之必要。
4. 因主要副作用為引起浮腫，血壓上升，對高血壓、腎臟疾患之使用須注意。
5. 對於有精神病因素之患者亦須注意。
6. 使用本劑期間須充分補充蛋白質。
7. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
8. 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

「包裝」：1mlx10A、2mlx10A、10mlx5A、5mlx10A

GP 政德製藥股份有限公司
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號