

" 優生 " 止 痛 錠

Zuton Tablets "Yu Sheng"

(衛署藥製字第018756號)
LT-035-ZT

【主要成分】：每粒含量

Ethoxybenzamide	200mg
Acetaminophen.....	80mg
Bromvalerylurea.....	100mg
Caffeine Anhydrous.....	25mg

【適 應 痘】：解熱、鎮痛(頭痛、牙痛、月經痛、神經痛、關節痛、肌肉痛、風濕痛)之緩解。

【用法 · 用量】：成人：1次2粒，1日3次。8-14歲：1次1粒，1日3次。

【類 別】：本藥須由醫師處方使用。

【警語與注意事項】

1. 肝毒性：

- (1) 使用acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部分發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
- (2) 過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
- (3) 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

2. 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

3. 過量：

- (1) 服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
- (2) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
- (3) Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

4. 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、荨麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命必須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

5. 嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

6. 在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥劑者，避免重複使用。

7. 避免長期使用。

8. 本劑應置於小孩伸手不及處。

9. 應用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。

【賦 形 劑】：Lactose, Sodium Starch Glycolate, PVPK-30,
Mag. Stearate, Talc

【包 裝】：12~1000粒/塑膠瓶、鋁箔盒裝。

【儲存條件】：室溫25°C以下保存。



優生製藥廠股份有限公司
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201706-4