



◆成 分：Each tablet contains:

Glibenclamide.....5 mg

◆本 質：

Glibenclamide 又名 Glyburide, Glybenclamide 其試驗名編號 HB419 或 U26452，化學名為：N-P-[2-(5-chloro-2-methoxy-benzamide)ethyl]benzenesulphonyl-N-cyclohexylurea，分子式 C₂₃H₂₈C₁N₃O₅S。

本藥為白色或類白色細晶性粉末，無味、殆無臭味、不溶于水或乙醚，可溶于酒類，應避光。

◆作 用：

本劑是一種磺基尿素 Sulphonylurea 系統之降血醣劑，具有優異之降血醣作用，比 Chlorpropamide 藥效強，比 Tolbutamide 安全，其作用機序為刺激胰臟之 β -細胞而刺激 Insulin 之分泌，本劑單獨使用時不影響肌醣 (Muscle-glucose) 之代謝作用。

本劑經口服後，三小時內即可降低血醣濃度，藥效可持續 15 小時，Glibenclamide 5 mg 之降血醣作用相當於 1 g 之 Tolbutamide 或 Glymidine, 500 mg 之 Acetohexamide, 250 mg 之 Chlorpropamide 或 Tolazamide。

◆適 應 痘：

成人型糖尿病。

◆用法用量：

通常一日量由 2.5 mg (半錠) 開始服用，然後適宜增量而決定其維持量，一般之維持量一日為 2.5 mg-5 mg，早飯後立即服用，最高量可達 1 日 15 mg，分兩次，早晚飯後立即服用。本藥須由醫師處方使用。

※本劑因降血醣作用甚強，故須於飯中或飯後立即服用。

◆包 裝：

60 Tab, 100 Tab, 500 Tab, 1000 Tab 瓶裝。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄縣岡山鎮烏鵲路 76 號
TEL:(07)2818266 • (07)6214922