衛署藥製字第 19558 號

Naproxen Naproxen Naproxen

〝皇佳〞 那必治 錠 (那普洛仙)

Naproxen Tablets 〝Royal〞

由於工作的緊張忙碌，〝疼痛〞已經是今日工業社會中，大部份人所訴苦的一種病狀之一。

目前一般的鎮痛消炎劑中如比林系藥物、類固醇製劑或麻醉性製劑，經過長時間之使用後，發現其對於人體之損害 (如 Agranulocyto penia, sever peptic ulcer, hypertension 等) 遠較其主要療效為大，因此許多的專家學者乃致力於開發新的藥物，使其副作用減低，而療效提高。

本品之主成分 Naproxen 就是經過長期研究改良而開發的一種新型、長效型的鎮痛消炎劑，不但其主要功效卓越，而且副作用也降低至最少之程度，因此在目前已經受到醫藥界廣泛的使用。

主 成 分：每錠含有：
Naproxen 250mg

賦 形 劑： Avicel PH101、Corn starch、Prejel 97、Mg. stearate、Primojel。

藥理特性：1. 本品之鎮痛作用於動物試驗，對於 Adrenalectomy 之動物 (腎上腺切除之動物) 仍然有效，這可能由於本品會抑制 Prostagland synthet，減少 Prostaglandin 之合成，而這種 Prostaglandin 過多，聚集於感覺神經細胞周圍，就是造成疼痛之主因，而一般之鎮痛劑只是對於視丘下部之痛覺阻斷而已，對於腎上腺切除之動物無效，因此本品是一種較特殊之鎮痛劑。
2. 本品具有末梢性抗炎作用，因此對於風濕性關節炎有效。
3. 本品在血液中和血清蛋白的親和力（Affinity）很強，因此排泄較為緩慢，可保持較長久之血中有效濃度，是長效型之鎮痛消炎劑。
4. 本品對胃腸道之障害較 Aspirin 少，而且對於 Prothrombin time 之延長也較 Aspirin 小，安全性較 Aspirin 高。
5. 非比林系、非類固醇製劑，故副作用少。

適 應 症：拔齒後發炎、關節炎、背腰疼痛、及多發性神經炎。

用法用量：成人一次 1 錠，一日口服 2 次，飯後服用。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1. 對於伴有潰瘍之疾患，最好能和 Gold Salts 併用，以提高對腸胃道之保護作用。
2. 本品療效卓著，可單獨使用，若和 Aspirin 併用時，反而會降低本品在血中之濃度，影響療效。
3. 本品和抗凝血劑合用時 (如 Bihydroxycoumarin) 有加成作用，應小心使用。

包 裝：6～1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

儲 存：25℃避光貯存。

皇佳化學製藥股份有限公司
ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.
高雄市鳥松區松埔路一巷 1 號電話：(07)7310537
傳真：(07)7310538