

# “華孚”胃思康錠

## T.S.G. Tablets "W.F."

成分：每錠內含：

Dried Aluminum Hydroxide Gel.....250mg

Magnesium Trisilicate.....500mg

作用：Dried Aluminum Hydroxide Gel：中和胃酸，作用溫和，不會引起胃壁分泌過多胃酸（Acid Rebound）。

Magnesium Trisilicate：制酸作用緩慢中和胃酸。

適應症：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

用法用量：一天3至4次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。醫師藥師藥劑生指示藥品。

**注意事項：一· 為防止兒童誤食請妥善保管。**

**二· 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**

**三· 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。**

**四· 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。**

**警語：一· 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：**

**(一) 未滿3個月之嬰兒不得服用。**

**(二) 本藥每日最大建議劑量之含鎂量超過 50mEq (0.6g)，腎疾患者不要服用。**

**(三) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。**

**(四) 制酸劑不得併用其他藥品。**

**二· 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。**

**三· 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。**

**四· 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。**

**五· 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis Encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。**

**六· 本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。**

**七· 本藥含碳酸鹽 (或碳酸氫鹽) 之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。**

儲藏：儲存於25°C以下乾燥陰涼處。

包裝：12-1,000錠塑膠瓶裝。

衛署藥製字第019578號

委託者：華孚藥品股份有限公司 台北市天水路67號8樓

TEL：(02) 2559-9177

製造廠：政德製藥股份有限公司 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號