

制 酸 劑

“永昌” 永胃平錠 (鋁鎂錠)

Yun We Pi Tablets “Y.C.”

衛署藥製字第20066號 健保代碼A020066100

本品是由二種制酸劑所組合而成，其藥理作用如下：

Aluminum Hydroxide：可中和過多的胃酸，並有保護胃十二指腸粘膜避免受胃酸刺激。

Magnesium Hydroxide：亦可中和過多之胃酸。

【成 份】每錠中含有：

主成份：Aluminum Hydroxide dried gel..... 300mg
 eq to Aluminum Hydroxide..... 230mg
 Magnesium Hydroxide..... 85mg
 每錠酸中和能力不少於7.2mEq，鎂含量為3mEq。

賦形劑：Lactose.Starch. Pregelatinised Starch.Hiron-600.Magnesium Stearate.

Menthol.Saccharin Soluble

【適應症】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法用量】1. 成人一次2錠，一天3至4次，或需要時服用。

2. 制酸劑應嚼碎後吞服。

3. 年齡分配係數：

12歲以上，適用成人劑量。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警 語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
 - (2) 未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (3) 本藥每日最大建議劑量之含鎂量超過50mEq(0.6g)，腎疾患者不要服用。
 - (4) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (5) 制酸劑不得併用其他藥品。
2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
4. 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
5. 本藥含鎂之製酸成分可能會引起腹瀉。

【包裝】12-1,000錠塑膠瓶裝

【貯藏法】本品應置於密蓋容器內室溫15~30℃貯之。



委託者：永昌藥品股份有限公司

台中市大甲區光明路140號3樓

TEL:(04)2 6 8 7 7 1 1 4~5

FAX:(04)2 6 8 7 2 4 4 2

製造廠：利達製藥股份有限公司

台中市大甲區中山路一段906號