衛署藥製字第 20111 號

Trisdown Trisdown Trisdown Trisdown

〝皇佳〞三速降 膠衣錠

Trisdown F.C.Tablets〝Royal〞

高血壓往往為腦溢血之主因。

時下高血壓顯出症狀的以及有高血壓潛在因子的患者，在台灣，甚至全世界各地，都已達到相當大的數目。高血壓的發生與個人的體質及精神狀態，居住及工作環境，個人的生活習慣，心臟及血管、腎臟的機能均有極密切的關係。所以在現代社會中，高血壓的預防及治療乃同等重要。治療高血壓的藥物很多，但應隨著病因及病情選擇適宜用藥，才不致發生藥不對症，以及其他的副作用或危險性。

【成　分】：每錠含有

Reserpine…… 0.1mg

Hydralazine Hydrochloride…… 10mg

Hydrochlorothiazide…… 10mg

【賦 形 劑】：

Cellatose、Calcium CMC、Magnesium stearate、Talc、Sepifilm 5002、Polishing wax 103。

【作用特點】：

一、具有確實控制血壓的作用。

本品綜合了三種不同的抗高血壓成分，較單獨使用更能發揮廣泛而確實的治療功效。

二、具有降低心縮壓及心舒壓的作用。

本品改善了過去單一成分的缺點，同時改善心縮壓及心舒壓在臨床治療上特別顯出意義。

三、具有減輕緊張及情緒不安的作用。

本品含有精神安定劑，一面改善血壓，一面調整高血壓病人的緊張不安之心緒。

四、增加腎臟血流量，預防高血壓性臟器受損傷。

本品內含 Hydralazine，降低血壓的同時可增加腎臟血流量預防腎缺血，排除體內多於的水分，防止昇壓物質（Renin）之刺激，保護高血壓性腎、心臟及腦組織免受損傷。

五、具有擴張細小動物及減少末梢血管之抵抗作用。

本品作用於中樞及末梢血，擴張主要血管壁，減少末梢血管之抵抗。

六、劑量少，副作用低，適用於長期治療。

本品含三種複合劑成分，較個別劑量減少，副作用減至最低程度，不傷腸胃，服用簡便，長期治療效果確實。

【適 應 症】：高血壓。

【用法用量】：通常成人口服每天 3～6 錠，分 2～3 回服用，依症狀之輕重可適當調整用量。

本藥須由醫師處方使用。

【警語與注意事項】：

一、光過敏：

曾有使用 thiazide 類利尿劑而發生外露部位皮膚紅疹(光線敏感症)的案例。如果發生光線敏感症，建議停止治療。如果再次投藥是必要的，建議保護陽光或人工輻射曝曬的部位。

二、非黑色素細胞惡性皮膚腫瘤 (non-melanocytic skin malignancies, NMSC)：

近期藥物流行病學研究發現，hydrochlorothiazide(HCTZ)與非黑色素細胞惡性皮膚腫瘤 (non-melanocytic skin malignancies, NMSC)之間存在有具累積劑量依存在的關聯性，藥物的光敏感極可能是潛在作用機轉。因此處方本藥品時應告知病人相關風險。若發現可疑皮膚病，建議告知您的處方醫師，必要時請皮膚科醫師檢查。

三、治療初期有眩暈、心悸、噁心等副作用，若發現有關節炎的病症，或血液異常時，應即停藥。

四、急性近視與續發性隅角閉鎖型青光眼：Hydrochlorothiazide 是一種磺胺類藥物，會引起特異體質反應，導致急性短暫近視與急性隅角閉鎖型青光眼，症狀包括急遽的視力下降或眼部疼痛，通常發生在開始用藥後數小時至一週內，急性隅角閉鎖型青光眼若未加以治療，可能導致視力永久喪失，主要治療方式為儘快停止使用 Hydrochlorothiazide。若仍未能有效控制眼壓，可能即需考慮立即尋求醫療或手術程序。引發急性隅角閉鎖型青光眼的風險因子，包括曾使用磺胺類或青黴素等藥物發生過敏之病史。

包　　裝：6~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

皇佳化學製藥股份有限公司
ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.
高雄市鳥松區埔安街 1 號 電話：(07)7310537
傳真：(07)7310538