



非比林系綜合感冒藥

“華興”貝適可 離粒 *Cold Granule “H.H.”*

衛署藥製字第 020125 號

傷風感冒是日常生活中最易染患之疾病，若是處之不當，易引發更嚴重之併發症，因而傷風感冒有萬病之源之稱。華興貝適可顆粒是治療傷風感冒之優良配方。本劑為「非比林系製劑」，配合多種製劑，以標本兼治之策，針對感冒傷風所引致諸症狀的醫治，對於「比林劑」有特異體質的患者，可以安心使用，且殆不引起胃障礙等副作用。

【特性】

- (1) 本劑配有最具活性、藥效最大之抗組織胺劑 Chlorpheniramine Maleate，以抵制傷風感冒之過敏症狀，可以最短時間消除感冒之諸症狀，並能防止轉重。
- (2) 本劑配與解熱效力最優，副作用最少，藥效迅速，及具有鎮癢作用的藥物 Acetaminophen、Aspirin Aluminium、Ethoxybenzamide 三種，對於傷風感冒引起的頭疼、發熱、關節疼痛，能迅速解除且藥性溫和。
- (3) 本劑含有中樞神經興奮劑 Caffeine Anhydrous 為一良好改善傷風感冒而引起之頭痛，再配合交感神經擬藥 dl-Methylephedrine 為一優良之支氣管鬆弛劑，又可免除感冒引起之筋肉疼痛，咽喉痛亦具有緩解之效。
- (4) 本劑配與具抑制咳嗽中樞及舒緩呼吸道之局部刺激而具強力鎮咳作用的製劑 Codeine phosphate，以及祛痰、鎮咳作用良好的 Potassium Guaiacol Sulfonate，此兩者之搭配於本處方便本劑之治療方策更臻致完美之境。
- (5) 綜合上面製劑特性，本製劑確實是一種理想的綜合感冒製劑，且本劑又配合無臭性之活性持續性維生素 B1 衍生體製劑 T.D.S 為一具有脂溶性，對於傷風感冒引起之神經炎、神經痛、肌肉疼痛具有顯著之神經活動力及鎮痛效果，促使本劑更達到理想之綜合感冒製劑。

【成 分】

每 1 公克顆粒中含：

Chlorpheniramine Maleate.....	2.5mg
Acetaminophen.....	200mg
Ethoxybenzamide.....	150mg
Caffeine Anhydrous.....	30mg
Codeine phosphate.....	4.8mg
dl-Methylephedrine HCl.....	10mg
Potassium Guaiacol Sulfonate.....	69mg
Thiamine Disulfide.....	.8mg
Riboflavin.....	.4mg

【適應症】

感冒諸症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、發熱、頭痛）之緩解。

【用法用量】

通常成人 1 回 1 公克，每日服用 3 回，於飯後 30 分鐘以內服用。（所附量匙為 1 公克）
本藥須由醫師處方使用

【注意事項】

- (1) 本劑含有劇藥，應切實按照所定服用方法及劑量使用。
- (2) 在就診中上使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者應避免重複使用。
- (3) 應用本劑數次仍未見症狀改善時應即停止使用。
- (4) 避免長期使用。
- (5) 本劑應置於小孩伸手不及之處。
- (6) 服用本劑者應避免開車。
- (7) 長期使用易致成癮。

【警語】

- (一) 早產兒、1歲以下嬰兒及1~2歲幼兒，不建議使用。
- (二) 2~12歲兒童，依年齡減量使用。
- (三) 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【警語及注意事項】**(一) 肝毒性**

1、使用 acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。

2、過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。

3、有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

(二) 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(三) 過量：

1、服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

2、本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

3、Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床試驗及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

(四) 過敏 / 過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命必須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(五) 嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿胞病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文氏-強生症候群 (Steven-Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【包裝】

100、500、1000 克瓶裝、1000 克罐裝。

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6