

“長安”喜咳康膠囊

Sicocan Capsules “C. A.”

【成分】 Each Capsule Contains :

Codeine Phosphate	4.8 mg
Chlorpheniramine Maleate	2 mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride	10 mg
Papaverine Hydrochloride	14 mg
Guaiphenesin	50 mg

【賦形劑】 Microcrystalline Cellulose, Lactose.

【作用】

- (1) Codeine Phosphate 抑制咳嗽中樞及舒緩呼吸道之局部刺激而具鎮咳作用，又抑制視床、大腦皮質之知覺領，而具中樞性鎮痛作用和鎮靜作用。
- (2) Papaverine HCL 直接作用於平滑肌，緩解平滑肌之異常緊張和痙攣並使血管擴張而具有 a. 支氣管擴張作用 b. 緩解各種平滑肌痙攣如胃、腸管、輸尿管、膽管疝痛及月經困難時之鎮痙劑。
- (3) Codeine Phosphate 與 Papaverine Hydrochloride 配合，其藥理學上之作用可分兩方面言之：a. Codeine Phosphate 之咳嗽中樞抑制作用與 Papaverine Hydrochloride 之支氣管擴張力作用相配合，可發揮鎮咳作用及易於咯出濃痰。b. Papaverine Hydrochloride 之平滑肌鎮痙作用與 Codeine Phosphate 之中樞性鎮痛、鎮靜作用相配合，可迅速消除各種平滑肌痙攣所引起之疝痛、劇痛。
- (4) Chlorpheniramine Maleate 為 Antihistamine 治療過敏性症狀、打噴嚏、流鼻水、淚眼。
- (5) DL-Methylephedrine Hydrochloride 能使支氣管擴張、易於咯出濃痰。
Guaiphenesin 能增加氣管內分泌物之排泄，而有顯著之祛痰作用。

【適應症】

鎮咳（感冒、急慢性支氣管炎、咽頭炎、喉頭炎所引起之咳嗽）。

【用法用量】

通常成人一次一粒，8-15 歲半粒，依年齡適減之，一日服用三次，飯後 30 分內服用。
本藥須由醫師處方使用。

【警語】

- 一、(1)早產兒、1 歲以下嬰兒及 1-2 歲幼兒，不建議使用 (2)2-12 歲兒童，依年齡減量使用 (3)肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。
- 二、長期使用易致成癮。

【包裝規格】 100, 200, 500, 1000 顆瓶裝

衛署藥製字第 020157 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號