

註 (1)報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

衛署藥製字第 020278 號

## "汎生" 胃全錠

Weichuan Tablets "Panbiotic"

在消化器官疾患中經常遇到的問題，以頑固的腹痛、噁心、嘔吐、膨滿感為最多，Weichuan 錠抑制胃腺刺激分泌激素"Gastrin"之產生來抑制胃酸，並直接作用於胃內在性末梢神經，使產生止痛效果。

成份：每錠含：

Oxethazaine..... 10mg  
Aluminium silicate Synthetic ..... 200mg

單次劑量(2 錠)之酸中和能力為 1.9mEq。

特徵：

1. 本品俱有局部麻醉作用：對胃之疼痛有止痛效果。
2. 抑制胃酸分泌作用：本劑乃用於胃幽門前庭部之末梢神經部位，使之麻醉，以阻止胃腺所分泌之激素"Gastrin"之游離。
3. 本劑有緩和及抑制胃之過度緊張及運動昂進作用，直接作用於胃內在末梢神經麻醉昂進之神經，減少疼痛之痛苦。

適應症：

胃炎、腸炎、食道炎所伴隨之胃痛、胃酸過多、胃部不適或灼熱感。

用法用量：

一天 3 至 4 次，或需要時服用。成人每次 2 錠。12 歲以上，適用成人劑量。

6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量之 1/4。3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警語：

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - (1) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
  - (2) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
  - (3) 制酸劑不得併用其他藥品。
  2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
  3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
  4. 含鋁之制酸成分增列下述警語：
    - (1) 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。
    - (2) 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。
    5. 有些病人可能對 Oxethazaine 過敏，偶有過敏現象。過敏症狀如：皮膚發疹、搔癢症、舌炎、血管水腫。
    6. Oxethazaine 服用過量，有些病人可能會有眩暈昏厥，嗜睡的情形。
    7. 含 Oxethazaine 之胃腸製劑，只建議在成人使用，孕婦、授乳婦及未滿 12 歲小孩不建議使用。

包裝：16~1000錠塑膠罐裝



臺灣汎生製藥廠股份有限公司

高雄市鳥松區大同路5-1號 07-7317861